



تقييم تأثير التغيرات في المياه المتاحة على انتاجية المحاصيل الزراعية

تقرير دراسة الحالة في العراق



مشروع تعزيز الامن الغذائي والمائي من خلال التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية

تقييم تأثير التغيرات في المياه المتاحة
على انتاجية المحاصيل الزراعية
في المنطقة العربية

تقرير دراسة الحالة في العراق



© 2019 الأمم المتحدة
حقوق الطبع محفوظة

تقتضي إعادة طبع أو تصوير مقتطفات من هذه المادة الإشارة الكاملة إلى المصدر.

توجّه جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق والأذون إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)،
البريد الإلكتروني: publications-escwa@un.org: الموقع الإلكتروني: www.escwa.un.org

النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه المطبوعة هي للمؤلفين، ولا تمثل بالضرورة الأمم المتحدة
أو الدول الأعضاء فيها، ولا ترتب أي مسؤولية عليها.

ليس في التسميات المستخدمة في هذه المطبوعة، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان
من جانب الأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن
تعيين حدودها أو تخومها.

الهدف من الروابط الإلكترونية الواردة في هذه المطبوعة تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات وهي صحيحة في
وقت استخدامها. ولا تتحمل الأمم المتحدة أي مسؤولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت أو عن مضمون أي
من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها.
جرى تدقيق المراجع حيثما أمكن.

لا يعني ذكر أسماء شركات أو منتجات تجارية أن الأمم المتحدة تدعمها.

تتألف رموز ووثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام باللغة الإنكليزية، والمقصود بذكر أي من هذه الرموز الإشارة إلى
وثيقة من وثائق الأمم المتحدة.

مطبوعة للأمم المتحدة صادرة عن الإسكوا، بيت الأمم المتحدة، ساحة رياض الصلح،
صندوق بريد: 11-8575، بيروت، لبنان.

تقديم

تعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم جفافاً فهي إلى جانب كونها تقع في حزام المناطق الجافة وشبه الجافة مما يعكس بقلة الأمطار وندرته فإنها تتعرض لتغيرات كبيرة في معدلات الأمطار من عام إلى آخر وهذا ما ينعكس بشكل واضح على ندرة الموارد المائية المتاحة فيها من جهة إضافة إلى تأثير ذلك على الانتاج الزراعي وبالتالي توفر الغذاء والأمن الغذائي من جهة ثانية ولا شك أن النمو السكاني المتسارع والذي يعد من أعلى معدلات النمو في العالم ساهم هو بدوره في تفاقم الأزمة المائية والغذائية في المنطقة العربية.

وتطورت الأبحاث العلمية في مجال التغيرات المناخية وخاصة في المنطقة العربية لتؤكد بدوره أن المنطقة في مجملها ستتعرض إلى أشد التغيرات المناخية سواء من حيث انخفاض معدلات الأمطار أو من ناحية ارتفاع درجات الحرارة وازدياد واضح في تكرار دورات الجفاف. وهذه العوامل تؤثر سلباً على الانتاجية الزراعية بالنسبة للزراعات البعلية وإلى حد ما المروية منها .


ومن أجل تقييم تأثير التغيرات المناخية على الانتاجية الزراعية في المنطقة العربية فقد قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في إطار تنفيذها للمشروع الاقليمي حول «تعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية» وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية (سيدا) بتكليف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) -المكتب الاقليمي للدول العربية وبالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) لتنفيذ المكون الأول من هذا المشروع الذي يسعى الى تقييم الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية نتيجة تغير وفرة المياه من خلال استخدام توقعات موثوقة للمناخ والمعلومات القياسية الهيدرولوجية على المستوى الإقليمي والوطني.

ومن أجل ذلك تمت ترجمة دليل المستخدم والكتيب الخاص باستخدام برنامج أكو-كروب (AquaCrop) الذي تم تطويره من قبل الفاو إلى اللغة العربية والذي أثبتت الدراسات والأبحاث أنه يعتبر من الوسائل الحديثة الناجحة في التنبؤ بالإنتاجية الزراعية إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وتوفير الدعم الفني المباشر على استخدامه لكافة الفرق الوطنية من الدول العربية المشاركة في المشروع¹.

قامت هذه الفرق بعد ذلك بإعداد تقارير وطنية لتقييم الإنتاجية الزراعية لعدد معين من المحاصيل في مناطق محددة تحت تأثير التغيرات المناخية باستخدام نتائج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية (ريكار) الذي نفذته الاسكوا بتمويل من سيديا. وتشكل هذه التقارير الوطنية ثمرة كافة هذه الجهود وتتضمن مقترحات وتوصيات للتكيف مع تغيرات وفرة المياه نتيجة تأثيرات تغير المناخ.

والأمل معقود أن تشكل هذه الوثائق باللغة العربية مرجعاً للباحثين في الدول العربية المهتمين بالشأن الزراعي إضافة إلى إغناء المكتبة العربية بالمراجع العلمية المتخصصة.

¹ الدول المشاركة في المكون الأول للمشروع هي: الأردن، البحرين، تونس، السودان، العراق، فلسطين، لبنان، مصر، المغرب واليمن.



فريق الدراسة

السيد ضياء فاضل عياس

رئيس مهندسين زراعيين اقدم / وزارة الزراعة.

الدكتورة حمدة عبد الستار ارحيم

رئيس مهندسين زراعيين اقدم / وزارة الموارد المائية.

السيدة الهام مهدي جواد

رئيس مهندسين زراعيين / وزارة الزراعة.

السيدة شذى سالم مجيد


رئيس مهندسين زراعيين / وزارة الموارد المائية.

السيد احمد عراك شلال

مهندس زراعي اقدم / وزارة التخطيط.

السيدة رنا سعود احمد

مهندس موارد مائية / وزارة الزراعة.



المحتويات

3	ص. 3	تقديم
5	ص. 5	فريق الدراسة
12	ص. 12	1. مقدمة
16	ص. 16	2. منطقة الدراسة والمحاصيل
17	ص. 17	محصول القمح
18	ص. 18	محصول الطماطة (البندوره أو الطماطم)
20	ص. 20	3. البيانات والمعاملات المستخدمة في الدراسة
20	ص. 20	المعاملات والبارامترات المعتمدة المستخدمة لمحصول الحنطة
22	ص. 22	المعاملات والبارامترات المعتمدة المستخدمة لمحصول الطماطة
25	ص. 25	4. معايرة النموذج باستخدام البيانات المقاسة
25	ص. 25	محصول الحنطة
27	ص. 27	محصول الطماطة
29	ص. 29	5. تطبيق برنامج «AquaCrop» والسيناريوهات المعتمدة المدروسة للتغيرات المناخية
29	ص. 29	6. نتائج الدراسة
30	ص. 30	أثر التغيرات المناخية على محصول الحنطة
35	ص. 35	تأثير النقص في الموارد المائية المتاحة للري على إنتاجية محصول الحنطة
40	ص. 40	أثر التغيرات المناخية على محصول الطماطة
46	ص. 46	تأثير النقص في الموارد المائية المتاحة للري على إنتاجية محصول الطماطة
52	ص. 52	7. انعكاسات الدراسة على السياسات الزراعية والاقتصاد الوطني
54	ص. 54	8. الخطة المستقبلية المقترحة للفريق
55	ص. 55	9. التوصيات

قائمة الاشكال البيانية

- ص. 16 **الشكل 1.** خارطة موقعية لمنطقة الدراسة
- ص. 18 **الشكل 2.** خارطة تصنيف المحافظات حسب المساحة المزروعة لمحصول الحنطة لعام 2016
- ص. 19 **الشكل 3.** تأثير درجات الحرارة على نمو نبات الطماطة
- ص. 19 **الشكل 4.** خارطة تصنيف المحافظات حسب الإنتاج ومتوسط الإنتاجية لمحصول الطماطة التجميعي بانواعه لسنة 2016
- ص. 22 **الشكل 5.** المحطة المناخية في الصويرة
- ص. 25 **الشكل 6.** المقارنة بين الإنتاجية المقاسة والإنتاجية المتوقعة لمحصول الحنطة
- ص. 27 **الشكل 7.** المقارنة بين الإنتاجية المقاسة والإنتاجية المتوقعة لمحصول الطماطة
- ص. 28 **الشكل 8.** مخطط تركيز CO_2 حسب أربعة سيناريوهات (RCP)
- ص. 35 **الشكل 9.** التغيرات الحاصلة في إنتاجية الحنطة وفق تخفيض الرمي الى 20% و40% لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
- ص. 37 **الشكل 10.** الإنتاجية المئوية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من أجل السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون وعند تخفيض الرمي الى 20% و40%
- ص. 38 **الشكل 11.** التغيرات الحاصلة في إنتاجية الحنطة وفق تخفيض الرمي الى 20% و40% لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
- ص. 40 **الشكل 12.** الإنتاجية المئوية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من أجل لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون وعند تخفيض الرمي الى 20% و40% السيناريو RCP4.5 وRCP8.5
- ص. 47 **الشكل 13.** التغيرات الحاصلة في إنتاجية الطماطة وفق تخفيض الرمي الى 20% و40% لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
- ص. 48 **الشكل 14.** الإنتاجية المئوية خلال فترة الأساس 1985-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 عند ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون و تخفيض الرمي الى 20% و40%
- ص. 49 **الشكل 15.** التغيرات الحاصلة في إنتاجية الطماطة وفق تخفيض الرمي الى 20% و40% عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
- ص. 51 **الشكل 16.** الإنتاجية المئوية خلال فترة الأساس 1985-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 وعند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخفيض الرمي الى 20% و40%

قائمة الجداول

- ص. 12 **الجدول 1.** مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من الإجمالي للفترة (2010-2016)
- ص. 14 **الجدول 2.** البيانات والاحصاءات المهمة في العراق
- ص. 15 **الجدول 3.** المساحة والإنتاج والفلة لمجاميع الإنتاج النباتي والخضر (2016)
- ص. 15 **الجدول 4.** الفلة والإنتاج لمحصولي القمح والطماطة 2016
- ص. 15 **الجدول 5.** إنتاج القمح والطماطة ونسبة التغطية المتحققة والحاجة الفعلية للسكان محسوبة على اساس عدد السكان لعام 2016
- ص. 17 **الجدول 6.** الإنتاجية لمحصول الحنطة لمحافظة وأسط وقضاء الصويرة
- ص. 19 **الجدول 7.** إنتاجية محصول الطماطة لمحافظة وأسط وقضاء الصويرة
- ص. 20 **الجدول 8.** معاملات الزراعة لمحصول الحنطة
- ص. 20 **الجدول 9.** معاملات التي تتأثر بمقطع التربة لمحصول الحنطة
- ص. 21 **الجدول 10.** معاملات التربة لمحصول الحنطة
- ص. 21 **الجدول 11.** فاصلة الارواء لزراعة محصول الحنطة
- ص. 22 **الجدول 12.** العناصر المناخية المسجلة في محطة الصويرة
- ص. 22 **الجدول 13.** معاملات الزراعة لمحصول الطماطة
- ص. 23 **الجدول 14.** معاملات التي تتأثر بمقطع التربة لمحصول الطماطة
- ص. 23 **الجدول 15.** معاملات التربة لمحصول الطماطة
- ص. 24 **الجدول 16.** فاصلة الارواء لزراعة محصول الطماطة

- ص. 25. **الجدول 17.** دورة النمو والتبخر نتج المرجعي والفعلية والإنتاجية المائية لمحصول الحنطة خلال فترة الدراسة
- ص. 26. **الجدول 18.** المعايير الاحصائية لمحصول الحنطة
- ص. 27. **الجدول 19.** دورة النمو ومقدار التبخر نتج المرجعي والفعلية والإنتاجية المائية لمحصول الطماطة خلال فترة الدراسة
- ص. 27. **الجدول 20.** المعايير الاحصائية لمحصول الطماطة
- ص. 29. **الجدول 21.** التغيرات المناخية المتوقعة للهطول المطري والحرارة الصفرية والعظمى للفترتين (2020-2030) و(2040-2050) مقارنة بفترة الاساس (1985-2005) للنماذج EC-Earth, CNRM-CM5, GFDL-ESM2M وفقاً للسيناريو RCP4.5 لمحصول الحنطة
- ص. 30. **الجدول 22.** التغيرات المناخية المتوقعة للهطول المطري والحرارة الصفرية والعظمى للفترتين (2020-2030) و(2040-2050) مقارنة بفترة الاساس (1985-2005) للنماذج EC-Earth, CNRM-CM5, GFDL-ESM2M وفقاً للسيناريو RCP8.5 لمحصول الحنطة
- ص. 31. **الجدول 23.** متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 31. **الجدول 24.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 31. **الجدول 25.** التبخر- النتج المرجعي والفعلية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 31. **الجدول 26.** الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 32. **الجدول 27.** متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 32. **الجدول 28.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 32. **الجدول 29.** التبخر- النتج المرجعي والفعلية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 32. **الجدول 30.** الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 33. **الجدول 31.** متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 33. **الجدول 32.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 33. **الجدول 33.** التبخر- النتج المرجعي والفعلية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 34. **الجدول 34.** الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 34. **الجدول 35.** متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 34. **الجدول 36.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 35. **الجدول 37.** التبخر- النتج المرجعي والفعلية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 35. **الجدول 38.** الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

- ص. 36 **الجدول 39.** متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 36 **الجدول 40.** متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 36 **الجدول 41.** التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO_2 وعند تخفيض الري 20 و40%
- ص. 37 **الجدول 42.** التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO_2 وعند تخفيض الري 20 و40%
- ص. 37 **الجدول 43.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO_2 وعند تخفيض الري 20 و40%
- ص. 38 **الجدول 44.** متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 39 **الجدول 45.** متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 39 **الجدول 46.** التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO_2 وعند تخفيض الري 20 و40%
- ص. 39 **الجدول 47.** التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO_2 وعند تخفيض الري 20 و40%
- ص. 39 **الجدول 48.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO_2 وعند تخفيض الري 20 و40%
- ص. 41 **الجدول 49.** يبين التغيرات المناخية المتوقعة للهطول المطري والحرارة الصغرى والعظمى للفترتين (2020-2030) و(2040-2050) مقارنة بفترة الاساس (1985-2005) للنماذج EC-Earth, CNRM-CM5, GFDL-ESM2M وفقاً للسيناريو RCP4.5 لمحصول الطماطة
- ص. 41 **الجدول 50.** يبين التغيرات المناخية المتوقعة للهطول المطري والحرارة الصغرى والعظمى للفترتين (2020-2030) و(2040-2050) مقارنة بفترة الاساس (1985-2005) للنماذج EC-Earth, CNRM-CM5, GFDL-ESM2M وفقاً للسيناريو RCP 8.5 لمحصول الطماطة
- ص. 42 **الجدول 51.** متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 42 **الجدول 52.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 42 **الجدول 53.** التبخر- النتج المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 43 **الجدول 54.** الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 43 **الجدول 55.** متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 43 **الجدول 56.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 44 **الجدول 57.** التبخر- النتج المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون
- ص. 44 **الجدول 58.** الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

44. ص. **الجدول 59.** متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
45. ص. **الجدول 60.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
45. ص. **الجدول 61.** التبخر- النتح المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
45. ص. **الجدول 62.** الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
46. ص. **الجدول 63.** متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
46. ص. **الجدول 64.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
46. ص. **الجدول 65.** التبخر- النتح المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
46. ص. **الجدول 66.** الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
47. ص. **الجدول 67.** متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
47. ص. **الجدول 68.** متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% في حالة السيناريو RCP8.5 عند ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
48. ص. **الجدول 69.** التبخر- النتح الفعلي خلال فترة الأساس 1985-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP4.5 عند ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 وتخفيض الري 20 و40%
48. ص. **الجدول 70.** التبخر- النتح الفعلي خلال فترة الأساس 1985-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP8.5 عند ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 وتخفيض الري 20 و40%
49. ص. **الجدول 71.** متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1985-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 عند زيادة تركيز وثبات غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 و تخفيض الري 20 و40%
50. ص. **الجدول 72.** متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% من اجل السيناريو RCP4.5 عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
50. ص. **الجدول 73.** متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% في حالة السيناريو RCP8.5 عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون
50. ص. **الجدول 74.** التبخر- النتح الفعلي خلال فترة الأساس 1985-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 وعند تخفيض الري 20 و40%
51. ص. **الجدول 75.** التبخر- النتح الفعلي خلال فترة الأساس 1985-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP8.5 عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 و تخفيض الري 20 و40%

1. مقدمة

إن مناخ العراق شبه قاري متأثر بمناخ البحر الأبيض المتوسط، يؤدي إلى اتساع المدى الحراري اليومي والسنوي مما ينعكس على زيادة في نسبة التبخر.

يواجه القطاع الزراعي عدة مشاكل وتحديات يزداد تأثيرها مع توالي سنوات الجفاف وتذبذب سقوط الأمطار والتغيرات البيئية والطلب المتزايد والمنتجات الزراعية الذي ينعكس على طلب المياه، مع محدودية العرض نتيجة للنمو السكاني مما أدى إلى عدم الاكتفاء الذاتي وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياتها، ونتيجة لذلك اتجهت الدولة نحو الاستيراد من الخارج لسد العجز وهذا يكلف الاقتصاد العراقي مبالغ كبيرة. والجدول رقم (1) يوضح مدى تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

هناك عدد من المحاور التي تلعب دوراً في تحقيق التنمية المستدامة تتمثل في الموارد، المؤثرات، السياسات التي من المهم إن تنتظم في منظومة متناسقة وتأخذ في الاعتبار التخطيط على المستوى المحلي وتأثير العوامل الخارجية، والتخطيط على المدى القصير والبعيد الأمد والذي لا يمكن تحقيقه بدون توفر البيئات المناسبة من بنية تحتية، وتمويل لعمليات الإنتاج والتسويق، وتشريعات تساعد في استقرار السياسات الحكومية بما يوفر الاطمئنان للمشاركين في التنمية أي إن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير البيئة المناسبة للوصول إلى أهدافها على المدى المنظور والبعيد يتطلب خطة وطنية تبنى على مجموعة من المعطيات منها (الموارد الطبيعية المتاحة، الأهداف المحددة، الرؤيا المستقبلية).

يعتبر العراق من البلدان الزراعية منذ القدم بسبب وفرة المقومات الأساسية للزراعة التي تتمثل في الموارد المالية، الموارد البشرية، الموارد الطبيعية (التربة، المياه) تبلغ مساحة العراق حوالي 174.8 مليون دونم وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة منها 28 مليون دونم بنسبة 16.1% من إجمالي مساحة العراق، أما الأراضي المروية فتبلغ ما نسبته 61.9% من مجمل الأراضي المزروعة فعلا وتتركز الزراعة المروية في المنطقة الوسطى والجنوبية، فيما تبلغ نسبة الأراضي الدائمة 38.1% من مجموع الأراضي المزروعة في العراق وتقع معظم هذه الأراضي في الشمال والشمال الشرقي.

تشير معظم الدراسات الى تدني الإنتاجية في وحدة المساحة مع وجود هدر كبير بالمياه نتيجة لاستخدام طرق ري قديمة وتقليدية حيث تتراوح كفاءة الري في العراق بين 60-70% إذ وتقدر نسبة الضائعات بالنقل بحدود 33% والضائعات الحقلية 40-30%. بالإضافة الى تأثر قسم كبير من الأراضي العراقية بمشكلة التملح والتغدق بالمياه الجوفية وخاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية بسبب سوء أعمال التشغيل والصيانة وانعدام شبكات البزل المتكاملة. وإن تغطية تلك الأراضي بشبكات الري تعتمد على مدى توفر المياه لاسيما وأن هناك خطط واسعة لاستخدام المياه من قبل دول المنبع في ضوء الاستخدام غير المنصف للمياه من قبل الدول المتشاطئة لأحواض الأنهر المشتركة (دجلة والفرات).

الجدول 1. مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من الإجمالي للفترة (2010-2016)

السنة	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي	4.17	4.5	3.7	3.88	3.6	3.1	3.05

** (المصدر): الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات/ دائرة الحسابات القومية

- إعداد نشرات وبرامج إرشادية لأسس تسميد المحاصيل حسب مناطق زراعتها.
- وضع نظام لتوزيع الأسمدة يتفق مع أنواع الأراضي وتوصيات البحوث الزراعية.
- تخطيط وتنفيذ برنامج لتحسين الأراضي من خلال عمل المبازل الحقلية والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية حسب توفر المخلفات الزراعية والمكنة الزراعية داخل الحقل.
- التشجيع على تنظيم صغار الفلاحين المستفيدين من الأراضي المستصلحة في إطار مؤسسات طوعية ترعى مصالحهم وتنظم إنتاجهم وتساعدهم في تسويقه.

سياسات تطوير الإنتاج والإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه

إن الهدف الاساسي من اعتماد عدد من السياسات في القطاع الزراعي لغرض رفع الإنتاجية التي تنعكس بدورها على زيادة الإنتاج لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل التي تتمتع بميزه نسبية تفاضلية في المنطقة، ومن هذه السياسات:

البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الزراعية:

- إعداد خطة بحثية وطنية للبحث الزراعي على إن تحدد الأهداف الأساسية المطلوب تحقيقها، والبرامج والمشروعات البحثية المطلوبة، والموازنات المالية لكل برنامج او مشروع بحثي، ومعايير تقييم نتائج البحوث، وإجراءات التنفيذ الواجب الالتزام بها خلال فترة زمنية محددة وفي هذا الصدد فإن هناك برنامج وطني للرتب العليا للحنطة.
- ربط المواضيع البحثية بالمشاكل التطبيقية الحقلية الموجودة في ميادين الزراعة المختلفة وبحثها من قبل منتسبي الوزارات المختصة.

السياسات المتعلقة بالاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية الطبيعية

سياسة ترشيد استخدام المياه:

تسعى هذه السياسة الى رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة نظر للارتفاع الكبير في نسبة الفواقد المائية في منظومات نقل وتوزيع المياه مما ينعكس على تدني كفاءة نظم الري. وفي هذا المجال من المكونات الأساسية للتنمية الزراعية تطوير كفاءة الري من خلال تطوير كفاءة النقل والتوزيع لمياه الري بالإضافة الى تطوير كفاءة الري الحقلية ولقد تم استخدام منظومات الري بالتنقيط وخصوصاً في الأراضي الديمة للري التكميلي وكذلك باستخدام المياه الجوفية على إن لا يكون هناك افراط في استخدام هذه المياه للمحافظة على الخزين المائي واستخدام الري بالتنقيط في زراعة الخضر المغطاة ولتشجيع المزارعين على اقتناء هذه المنظومات والتي يتم دعمها بنسبة 50% من اسعارها، وتشمل عناصر ومكونات هذه السياسة على:

- اعتماد المقننات المائية لمختلف المحاصيل مع الأخذ بنظر الاعتبار عناصر البيئة من تربة ومناخ ومياه.
- تحسين كفاءة نقل وتوزيع المياه من خلال تبطين القنوات الاروائية وتقليل نسب الفقد فيها.
- إحداث تعديل على التراكيب المحصولية في اتجاه تحسين معدلات العائد على وحدة المياه المستخدمة.

سياسة صيانة الأراضي الزراعية:

- هناك عدد من الآليات التي تستخدم لغرض صيانة وتطوير الاراضي الزراعية من خلال
- تحليل التربة الزراعية بشكل دوري، وتصنيف الأراضي وفقاً لهذه النتائج.
 - تحديد الاحتياجات السمدية للمحاصيل في مختلف أنواع الترب ومختلف مستويات الخصوبة وفي إطار نتائج البحوث الزراعية.

تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية

تشجيع القائمين على العملية الزراعية باستخدام أنظمة الجودة (IZO) للمنتجات الزراعية لمنافسة مثيلاتها المستوردة.

دعم وتطوير مناخ الاستثمار

- إعداد خريطة استثمارية للقطاع الزراعي وبلورة الفرص الملائمة للاستثمار الزراعي من خلال توفير قاعدة بيانات ومعلومات يتم تحديثها دورياً، وقد تم إعداد خارطة استثمارية للأراضي الزراعية التي تتوفر لها حصة مائية وخالية من مشاكل الحيازة كما إن التشريعات الخاصة بالاستثمار هي جاذبة للاستثمار وخصوصاً الاستقرار الذي بدأ يتحقق لأنه بدون استقرار لا يمكن أن يكون هناك استثمار.
- تحفيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم التميز والإبداع في الزراعة.

- وضع اتفاقيات للتعاون المشترك بين الأجهزة البحثية المتعددة والمشاركة في الموضوعات البحثية المدرجة بالخطة البحثية الزراعية الوطنية، على إن تخضع هذه الاتفاقيات للتقييم الدوري للحد من السلبيات وتعظيم العوائد الايجابية.
- التوجه نحو استنباط الأصناف المقاومة للملوحة والجفاف والأصناف قصيرة العمر وفي هذا المجال تم استنباط صنف دجلة والفرات لمحصول الحنطة.
- دعم التحول الى أنظمة الإنتاج المكثف اوشبه المكثف وتطبيق النظم الحديثة في الإنتاج الزراعي.

تطوير الإرشاد والإعلام الزراعي:

- تنفيذ برنامج لتدريب وإعداد المرشدين وحسب الاختصاصات المطلوبة وتدريب المزارعين على الزراعة الحديثة من خلال المزارع الإرشادية وأيام الحقل.
- مراجعة نظم وإجراءات العمل لتطويرها وإحكام عمليات التنسيق والتفاعل الأفقي والرأسي داخل المؤسسة الإرشادية وفيما بينها وبين أجهزة البحث الزراعي وتطبيق نتائج البحوث على الواقع الزراعي.

الجدول 2. البيانات والاحصاءات المهمة في العراق

عدد السكان / 2016	37883543 نسمة
عدد سكان الريف / 2016	11396399 نسمة
عدد سكان الحضر / 2016	26497144 نسمة
المساحة الكلية للعراق	174.4 مليون دونم
المساحة المزروعة لعام 2016	23 مليون دونم
المساحة الطبيعية / 2016	126.4 مليون دونم
الدخل القومي (مليون دينار) / 2016	187486415.2 مليون دينار
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي (دينار) / 2015	50762988 دينار
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2007 = 100) (مليون دينار) / 2015	182331154.1 مليون دينار
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (دينار) / 2015	49367172 دينار
مساحة المياه الإقليمية للعراق	924 كم ²
نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي / 2016	3.05%
إنتاج القمح لعام / 2016	3052900 طن
إنتاج الطماطة / 2016	286596 طن

الجدول 3. المساحة والإنتاج والفلة لمجاميع الإنتاج النباتي والخضر (2016)

2016		التفاصيل
الإنتاج (1000 طن)	المساحة المزروعة (1000 دونم)	
3993	5217	الحبوب
3.2	12.8	المحاصيل الزيتية
11.8	3.1	المحاصيل الصناعية
198.1	36.7	الدرنات والأبصال
12.73	33.07	البقوليات
923.5	300.9	المحاصيل العلفية
1014	375	الخضراوات
6157.1	5978.7	المجموع

الجدول 4. الفلة والإنتاج لمحصولي القمح والطماطة 2016

المحصول	المساحات المزروعة (دونم)	الإنتاج (طن)	الفلة (كغم/ دونم)
القمح	3,697,300	3,052,900	825.7
الطماطة	57,106	286,596	5,018.7

الجدول 5. إنتاج القمح والطماطة ونسبة التغطية المتحققة والحاجة الفعلية للسكان محسوبة على اساس عدد السكان لعام 2016

المحصول	نسبة التغطية المتحققة لعام 1993	الحاجة الفعلية (طن)	الإنتاج المتحقق (طن)	نسبة التغطية %	نسبة العجز %
القمح	40	5,316,861	3,052,000	54.8	45.2
الطماطة	90	2,604,171	618,000	24	76

2. منطقة الدراسة والمحاصيل

تقع منطقة المشروع عند خط عرض (33° 01') شمالاً وخط طول (44° 82') شرقاً. يحدها مشروع المسيب الكبير ومشروع كصيبية والشحيمية جنوباً ومزرعتي الصويرة شمالاً ومشروع الوحدة واللطيفية غرباً. يخترقها نهر دجلة والطريق العام بغداد - الكوت من الغرب الى الشرق وتقع الصويرة على الجهة اليمنى من نهر دجلة وكما موضح في الخارطة الموقعية رقم (1).

الصويرة مدينة تتبع لمحافظة واسط في العراق وهي مشهورة بمناطقها الزراعية وبساتين الفواكه والنخيل، يبلغ عدد سكانها 161 الف نسمة بحسب تعداد عام 2003. ويقع قضاء الصويرة شمال مدينة الكوت بمسافة 135 كيلومترا ويبعد عن مدينة بغداد نحو 55 كيلومتر جنوباً.

الشكل 1. خارطة موقعية لمنطقة الدراسة



محصول القمح

تنمية زراعة الحنطة في العراق بحاجة الدراسة وتقييم بغية معالجة الانحرافات ووضع التصورات الدقيقة عن الخطط المستقبلية .

بالرغم من الاشكالات العديدة التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق ولعل في مقدمتها مشاكل الإنتاجية سواء كانت تدهور إنتاجية الدونم الواحد او تدهور إنتاجية العمال المشتغلين في الزراعة، فضلا عن رداءة نوعية الإنتاج، إلا إن جهود حثيثة بذلت خلال الحقب الزمنية السابقة بغية اعادة تأهيل القطاع الزراعي وتنمية وتطوير المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها الحنطة بالنظر لاهمية هذا المحصول من حيث توفير بعض متطلبات الامن الغذائي من جهة ولترابطاته الامامية والخلفية بالقطاع الصناعي من جهة اخرى.

وتعد الحنطة محصول شتوي رئيسي يزرع على نطاق واسع في البلاد بطرق ري متعددة (الري بالرش، الزراعة الديمية، الري السيحي) وتعتبر المنطقة الشمالية والغربية التي تضم المحافظات (نينوى وصلاح الدين وكركوك والانبار) من المحافظات المتخصصة بزراعة هذا المحصول بالإضافة الى محافظة واسط التي تعتبر المحافظة الاولى في إنتاج القمح وتعتمد على الري السيحي ويتأثر إنتاج هذا المحصول نتيجة تذبذب هطول الأمطار.

تعتبر منطقة الدراسة (قضاء الصويرة) من اهم الاقضية التي تشتهر بزراعة هذا المحصول حيث يمثل إنتاج القضاء ما نسبته 20% من إنتاج المحافظة ويتم الاعتماد على الري السيحي في الزراعة وكما مبين في الجدول التالي:-

يعتبر محصول القمح ويسمى في العراق (الحنطة) المادة الرئيسية في توفير قوت الشعب كونه الغذاء الرئيسي للفرد العراقي وله أهمية إستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي حيث سعت الحكومات العراقية من خلال السياسات الزراعية المتعاقبة إلى الارتقاء بإنتاج المحصول على أمل الوصول الى الاكتفاء الذاتي إلا أنه لم يتم تحقيق هذا الهدف حيث ساد الاعتماد على الأستيراد لسد العجز من المحصول بالرغم من وضعه في سلم اولويات الدولة ولتحقيق الهدف المنشود تم وضع عدد من البرامج والمشاريع لهذا المحصول ومنها برنامج تنمية الحنطة الذي يهدف الى تحقيق إنتاجية طن/ دونم نهاية البرنامج وذلك لمواجهة نقص المساحات المزروعة نتيجة قلة المياه.


تحتل زراعة الحنطة اهمية استراتيجية بالنظر لسعة مبادلاتها في السوق الدولية، وهذا ما دفع الكثير من البلدان النامية والمتقدمة الى اعتماد سياسات اقتصادية تهدف إلى تنمية المحصول وتقويض استيراده بقصد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وهذا يعني إن الدولة تسعى الى رفع قدراتها التنافسية من هذا المحصول وتعزيز صادراتها وتنمية مصادر النقد الاجنبي لديها .

بعد العراق واحد من البلدان النامية الذي تتوفر فيه مقومات النشاط الزراعي من تربة خصبه ومياه وفيه ومناخ ملائم، انتهج ومنذ سنوات طويلة اسلوب تنمية زراعة الحنطة من خلال الدعم الحكومي المباشر تاره ومن خلال تقديم التسهيلات الائتمانية والضريبية تاره اخرى، غير إن مدى نجاح خطط

الجدول 6. الإنتاجية لمحصول الحنطة لمحافظة واسط وقضاء الصويرة

نسبته الى إنتاج المحافظة	إنتاج قضاء الصويرة (منطقة الدراسة) الف طن	نسبته الى الإنتاج الكلي	إنتاج محافظة واسط (الف طن)	الإنتاج الكلي للعراق (الف طن)
20%	136	20.7%	631	3052

الشكل 2. خارطة تصنيف المحافظات حسب المساحة المزروعة لمحصول الحنطة لعام 2016



الإنتاج يكون على فترات مختلفة طيلة السنة، حيث يزرع زراعة مغطاة وزراعة مكشوفة وبالاعتماد على أحد اساليب الري (الري السطحي، الري بالتنقيط).


الطماطة أو البندورة نبات من الفصيلة الباذنجانية (باللاتينية: Solanaceae) تزرع في المناطق المعتدلة والحارة تنتمي إلى الجنس Solanum، الاسم العلمي لها هو Solanum lycopersicum، وتزرع الطماطمة الآن على نطاق واسع، وغالباً ما تزرع في البيوت الزجاجية للحفاظ على درجة الحرارة. ويتم استهلاك الطماطمة بطرق كثيرة ومتنوعة، فيمكن استخدامه كثمرة خام دون إضافات، وهو عنصر في العديد من الأطباق والصلصات، والمشروبات، في حين إنه فاكهة من الناحية النباتية.

محصول الطماطمة (البندوره أو الطماطم)


تعتبر محاصيل الخضار من المحاصيل الثانوية التي تزرع في مناطق مختلفة من البلاد ويعتبر محصول الطماطمة من أهم هذه المحاصيل واحد مكونات سلة الغذاء للفرد العراقي وكذلك يتم استغلال جزء من الإنتاج في تصنيع معجون الطماطمة ومنتجات غذائية أخرى، ومن أهم المحافظات التي تشتهر بزراعة هذا المحصول هي (كربلاء، البصرة، نينوى، بغداد، النجف).

يزرع محصول الطماطمة في اوقات مختلفة من السنة وتختلف مواعيد الزراعة من منطقة الى اخرى وبالتالي فإن

الشكل 3. تأثير درجات الحرارة على نمو نبات الطماطة



الشكل 4. خارطة تصنيف المحافظات حسب الإنتاج ومتوسط الإنتاجية لمحصول الطماطة التجميعي بأنواعه لسنة 2016



تعتبر منطقة الدراسة محافظة وأسط (قضاء الصويرة) من الاقضية التي تزرع هذا المحصول حيث يمثل إنتاج القضاء ما نسبته 20% من إنتاج المحافظة ويتم الاعتماد على الري السبحي في الزراعة وكما مبين في الجدول التالي:-

الجدول 7. إنتاجية محصول الطماطة لمحافظة وأسط وقضاء الصويرة

نسبته الى إنتاج المحافظة	إنتاج القضاء الصويرة الف طن	نسبته الى الكلي	إنتاج محافظة (الف طن)	الإنتاج الكلي للعراق (الف طن)
76%	5.4	2%	7.03	286.6*

*وفق بيانات وزارة الزراعة لعام 2017.

3. البيانات والمعاملات المستخدمة في الدراسة

معاملات المحصول المتغيرة (الغير ثابتة) والتي تحتاج الى تعديل عند اختيار صنف مختلف عن الصنف الذي تم اختياره عند المعايرة او اذا اختلفت الشروط البيئية عن تلك التي تم افتراضها عند اجراء المعايرة.

أنواع المعاملات :

- أولاً: معاملات تتأثر بالزراعة والإدارة

المعاملات والبارامترات المعتمدة المستخدمة لمحصول الحنطة

تقسم المعاملات الى قسمين معاملات المحصول المحافظة (Conservative Crop Parameter) وهي معاملات لا تتغير بشكل كبير بتغير الزمن وإجراءات الإدارة والموقع الجغرافي والمناخ والصنف لذلك لا تحتاج الى معايرة.

الجدول 8. معاملات الزراعة لمحصول الحنطة

ت	المعاملات	بيانات المحصول
1	طريقة الزراعة	البيادر
2	كثافة الزراعة	2100000 نبات/هكتار.
3	الغطاء النباتي الاعظمي (CCx)	90%.
4	زمن الوصول الى 90% من الانبات	15 يوما.
5	الزمن اللازم للوصول الى الغطاء النباتي الاعظمي (CCx)	63 يوما.
6	الزمن اللازم لبدء تساقط أوراق النباتات	135 يوما.
7	الزمن اللازم للنضج الفيزيولوجي (طول دورة المحصول)	160 يوما.
8	توقيت بدء الازهار	105 ايام.
9	مدة الازهار	14 يوما.
10	دليل الحصاد المرجعي (H10)	38%.

- ثانياً: المعاملات التي تتأثر بخصائص مقطع التربة:

الجدول 9. معاملات التي تتأثر بمقطع التربة لمحصول الحنطة

ت	المعاملات	بيانات تتأثر بخصائص مقطع التربة
1	عمق الجذر الفعال الاعظمي (Zx)	0.35 م.
2	المدة لبلوغ عمق الجذور الفعال الأعظمي	75 يوما.

• ثالثاً: بيانات تربة الزراعة

الجدول 10. معاملات التربة لمحصول الحنطة

بيانات التربة	
46.35 %	محتوى التربة المائي عند الإشباع SAT
24.73 %	محتوى التربة المائي عند السعة الحقلية FC
12.33 %	محتوى التربة المائي عند نقطة الذبول الدائم PWP
45.74 %	محتوى التربة المائي عند الإشباع SAT
25.13 %	محتوى التربة المائي عند السعة الحقلية FC
12 %	محتوى التربة المائي عند نقطة الذبول الدائم PWP
15.02	النسبة المئوية للرمل Sand
53.15	النسبة المئوية للطيني Silt
31.83	النسبة المئوية للفضار Clay
13.89	النسبة المئوية للرمل Sand
52.71	النسبة المئوية للطيني Silt
33.40	النسبة المئوية للفضار Clay
1.16 م/م يوم	النقلية الهيدروليكية (Ksat) لعمق (0-1.5 م)
1 طبقة	طبقات التربة وعمق كل طبقة

قدرها 70% من سطح التربة وبفاصلة ارواء وفق الجدول التالي:

ادارة الري الحقلي لمحصول الحنطة:

تم اعتماد الري السطحي بواسطة الالواح ذات حدود بارتفاع قدرة 0.25م من سطح التربة وبنسبة ترطيب

الجدول 11. فاصلة الارواء لزراعة محصول الحنطة

ت	تاريخ الارواء	وقت الارواء (يوم)	عمق الري الصافي (مم)	ملوحة المياه (دسيسيمز/م)
1	1/11	1	45	1.2
2	18/11	18	33	1.2
3	6/12	36	30	1.3
4	26/12	56	35	1.4
5	14/1	75	38	1.3
6	3/2	95	38	1.3
7	23/2	115	40	1.3
8	13/3	133	60	1.3
9	5/4	156	82	1.3

الشكل 5. المحطة المناخية في الصويرة



الجدول 12. العناصر المناخية المسجلة في محطة الصويرة

Rain	R	الأمطار
Max Temperature	TM	درجة حرارة الهواء العظمى
Min Temperature	Tm	درجة حرارة الهواء الصغرى
Max Humidity	HM	الرطوبة النسبية العظمى
Min Humidity	Hm	الرطوبة النسبية الصغرى
Avg Wind Speed	WS	معدل سرعة الرياح
Total Solar Radiation	SRt	مجموع الاشعاع الشمسي الشهري
Avg Evapotranspiration	Eto-avg	تبخر نتح يومي

ادارة الحقل لمحصول الحنطة:

بلغ مستوى الخصوبة حوالي نصف التسميد بنسبة 50% وبدون تغطية لسطح التربة وادارة للاعشاب الضارة moderate (الغطاء النسبي للأعشاب الضارة 25%).

البيانات المناخية

البيانات المناخية المستخدمة هي بيانات تاريخيه لمنطقة الدراسة (الصويرة) للفترة من (1/1/2008) لغاية (31/10/2017) التي تم تسجيلها من المحطة المناخية في منطقة الصويرة وهذه المحطة تابعة لشبكة من محطات الطقس الاوتوماتيكية (Automatic weather station) تم نصبها وتشغيلها في مختلف المناطق الزراعية في العراق لغرض قياس عناصر الطقس المختلفة ذات التأثير على الزراعة مثل درجة حرارة الهواء, الرطوبة النسبية للهواء, سرعة الاشعاع الشمسي, الضغط الجوي, سرعة واتجاه الرياح, درجة حرارة التربة, رطوبة التربة, بالاطافة الى معلومات أخرى مثل ET, والتجميع الحراري, وحرارة نقطة الندى.

وترتبط الشبكة بمحطة استلام وتجميع البيانات في مركز الشبكة في بناية وزارة الزراعة في العاصمة بغداد حيث يتم نقل البيانات من المحطة المناخية الى المركز (مركز الأرصاد الجوية الزراعية) باستخدام منظومة الأقمار الصناعية وفق العناصر المناخية التالية:

المعاملات والبارامترات المعتمدة المستخدمة لمحصول الطماطة:

• أولاً: معاملات تتأثر بالزراعة والإدارة

الجدول 13. معاملات الزراعة لمحصول الطماطة

ت	المعاملات	بيانات المحصول
1	طريقة الزراعة	الفراس (الشتال).
2	كثافة الزراعة	25000 نبات/هكتار.
3	الغطاء النباتي الاعظمي (CCx)	CCx = 90%.
4	زمن الوصول الى 90% من الانبات	26 يوماً.
5	الزمن اللازم للوصول الى الغطاء النباتي الاعظمي (CCx)	45 يوماً.
6	الزمن اللازم لبدء تساقط أوراق النباتات	90 يوماً.
7	الزمن اللازم للنضج الفيزيولوجي (طول دورة المحصول)	120 يوماً.
8	توقيت بدء الازهار	35 يوماً.
9	مدة الازهار	70 يوماً.
10	دليل الحصاد المرجعي (H10)	50%.

• ثانياً: المعاملات التي تتأثر بخصائص مقطع التربة:

الجدول 14. معاملات التي تتأثر بمقطع التربة لمحصول الطماطة

ت	المعاملات	بيانات تتأثر بخصائص مقطع التربة
1	عمق الجذر الفعال الاعظمي (Zx)	0,35 م.
2	المدة لبلوغ عمق الجذور الفعال الأعظمي	35 يوماً.

• ثالثاً: بيانات تربة الزراعة

الجدول 15. معاملات التربة لمحصول الطماطة

بيانات التربة	
46.35 %	محتوى التربة المائي عند الإشباع SAT
24.73 %	محتوى التربة المائي عند السعة الحقلية FC
12.33 %	محتوى التربة المائي عند نقطة الذبول الدائم PWP
45.74 %	محتوى التربة المائي عند الإشباع SAT
25.13 %	محتوى التربة المائي عند السعة الحقلية FC
12 %	محتوى التربة المائي عند نقطة الذبول الدائم PWP
15.02	النسبة المئوية للرمل Sand
53.15	النسبة المئوية للطيني Silt
31.83	النسبة المئوية للفضار Clay
13.89	النسبة المئوية للرمل Sand
52.71	النسبة المئوية للطيني Silt
33.40	النسبة المئوية للفضار Clay
1.16 م / يوم	الناقلية الهيدروليكية (Ksat) لعمق (0-1.5 م)
1 طبقة	طبقات التربة وعمق كل طبقة

الجدول 16. فاصلة الارواء لزراعة محصول الطماطة

ت	تاريخ الارواء	وقت الارواء (يوم)	عمق الري الصافي (مم)	ملوحة المياه (دسيسيمز/م)
1	1/3	1	40	1.3
2	5/3	5	30	1.3
3	9/3	9	30	1.3
4	16/3	16	30	1.3
5	23/3	23	35	1.3
6	30/3	30	40	1.3
7	9/4	37	35	1.3
8	13/4	44	30	1.3
9	20/4	51	30	1.3
10	27/4	58	30	1.3
11	4/5	65	40	1.3
12	11/5	72	40	1.3
13	18/5	79	40	1.3
14	25/5	86	40	1.3
15	2/6	94	40	1.2
16	9/6	101	40	1.2
17	16/6	108	40	1.2
18	23/6	115	40	1.2

البيانات المناخية

البيانات المناخية المستخدمة هي بيانات تاريخيه لمنطقة الدراسة (الصويرة) للفترة من (1/1/2008) لغاية (31/10/2017) التي تم تسجيلها من المحطة المناخية في منطقة الصويرة وهذه المحطة تابعة لشبكة من محطات الطقس الاوتوماتيكية (Automatic weather station) وفق ما تم اعتمادة لمحصول الحنطة كون المنطقة المختارة للدراسة هي منطة واحدة للمحصولين.

ادارة الري الحقلي لمحصول الطماطة:

اذ تم اعتماد الري السطحي من خلال تحديد اختيار اعداد جدول ري وبنسبة ترطيب قدرها 70% من سطح التربة وبفاصلة ارواء وفق الجدول التالي:

ادارة الحقل لمحصول الطماطة:

بلغ مستوى الخصوبة حوالي النصف التسميد وبنسبة 50% وبدون تغطية لسطح التربة وادارة للاعشاب الضارة بصورة متوسطة (Moderate) (الغطاء النسبي للاعشاب الضارة 25%).


4. معايرة النموذج باستخدام البيانات المقاسة

محصول الحنطة

يبين جدول (17) بأن أقل فترة نمو سجلت خلال عام 2009 وهذا الانخفاض قابلة أنخفاض في معدل التبخر- نتح المرجعي والتبخر- نتح الفعلي للنبات مع زيادة بمعدل الإنتاجية المائية للنبات، كما وسجلت أعلى فترة نمو خلال عام 2011 مما أدى الى ارتفاع في معدل كل من التبخر- نتح المرجعي والتبخر- نتح الفعلي مع أنخفاض في معدل الإنتاجية المائية.

يبين من خلال شكل (6) مدى انخفاض الإنتاجية الحالية لمحصول الحنطة مقارنة بالإنتاجية المتوقعة وذلك بسبب وجود فروقات حادة بالإنتاج لمنطقة الدراسة بالإضافة الى قلة الفلاحين المسوقين للحاصل ليتم تسجيله في قيود وزارة الزراعة، بالإضافة الى إنه تم استثناء قرائتين للمحصول خلال سنتي 2007 و2008 لعدم دقة نتائج الحاصل فيها.

الشكل 6. المقارنة بين الإنتاجية المقاسة والإنتاجية المتوقعة لمحصول الحنطة



الجدول 17. دورة النمو والتبخر نتح المرجعي والفعلي والإنتاجية المائية لمحصول الحنطة خلال فترة الدراسة

Water Productivity (Kg/m ³)	Actual Evapotranspiration (mm)	Reference Evapotranspiration ETo (mm)	Cycle (day)	year
0.78	320	491	145	2008
0.8	316	444	136	2009
0.78	310	513	144	2010
0.72	331	601	155	2011
0.95	278	401	140	2012
0.85	300	408	147	2013
0.84	314	453	141	2014
0.81	334	431	144	2015
0.84	330	473	154	2016

المعايير الإحصائية التي تم اعتمادها :

تم حسابها وفق المعادلات التالية:-

Normalized Root Mean Square Error (NRMSE) -3

$$CV (RMSE) = \frac{1}{\bar{O}} \sqrt{\frac{\sum(P_t - O_t)^2}{n}} \times 100 \dots\dots\dots (3)$$

Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient (EF) -4

$$EF = 1 - \frac{\sum(P_t - O_t)^2}{\sum(O_t - \bar{O})^2} \dots\dots\dots (4)$$

Pearson correlation coefficient (R) -1

$$r = \left[\frac{\sum(O_t - \bar{O})(P_t - \bar{P})}{\sqrt{\sum(O_t - \bar{O})^2 \sum(P_t - \bar{P})^2}} \right] \dots\dots\dots (1)$$

Root Mean Square Error (RMSE) -2

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum(P_t - O_t)^2}{n}} \dots\dots\dots (2)$$

Willmott's index of agreement (d) -5

$$d = 1 - \frac{\sum(P_t - O_t)^2}{\sum(|P_t - \bar{O}| + |O_t - \bar{O}|)^2} \dots\dots\dots (5)$$

الجدول 18. المعايير الإحصائية لمحصول الحنطة

Interpretation	Value	Statistical standards
Moderate Good	0.757	r
Moderate Poor	0.530	RMSE
Moderate Good	19.790	CV
Moderate Poor	0.226	EF
Poor	0.460	D

وتشير المعايير الإحصائية التي تم اعتمادها وفق كل من المعادلات (5,4,3,2,1) وكما مبينة في جدول (18) لمعايرة الإنتاجية لمحصول الحنطة بوجود ضعف في الإنتاج الكلي رغم توفر الظروف المناسبة للزراعة من نوعية وكمية مياه ونوعية التربة وتوفر الظروف والمعايير الأخرى الخاصة بالزراعة لموقع الدراسة (منطقة الصويرة) ويعزى السبب في ذلك إلى عدم توفر معلومات دقيقة خاصة بتسجيل الحاصل الكلي للمنطقة وسوء إدارة الفلاح.

محصول الطماطة


المرجعي والتبخر- نتح الفعلي مع زيادة في الإنتاجية المائية لمحصول الطماطة. وبشكل عام فإن متوسط درجات الحرارة الشهرية تؤثر تأثيراً مباشراً على الاحتياج المائي للمحاصيل، وكلما زادت درجات الحرارة زادت معها الاحتياجات المائية.

كما يوضح جدول (20) قيم المعايير الإحصائية التي تم إيجادها لإنتاجية محصول الطماطة والتي تبين وجود توافق مقبول عند المقارنة بين الإنتاجية المقاسة والإنتاجية المتوقعة وفق برنامج AquaCrop بسبب كون الظروف مناسبة وشجعت من زيادة الإنتاجية.

يبين الشكل (7) إبان المعايرة بين الإنتاجية المقاسة والمتوقعة كانت جيدة مع تزايد درجات الحرارة كون محصول الطماطة من محاصيل الموسم الدافئ والتي تستجيب للتغيرات الحرارية بين الليل والنهار وكونه نبات محايد لطول النهار.

يبين جدول (19) تغير في فترات النمو وقد سجلت أقل فترة نمو (89) يوم خلال عام 2012 الذي يقابله زيادة في معدل التبخر نتح المرجعي والذي بلغ أعلى قيمة 989 مم مع تمييز عام 2013 بانخفاض كل من معدل التبخر- نتح

الشكل 7. المقارنة بين الإنتاجية المقاسة والإنتاجية المتوقعة لمحصول الطماطة



الجدول 19. دورة النمو ومقدار التبخر نتج المرجعي والفعلي والإنتاجية المائية لمحصول الطماطة خلال فترة الدراسة

Water Productivity (Kg/m ³)	Actual Evapotranspiration (mm)	Reference Evapotranspiration ETo (mm)	Cycle (day)	year
0.45	554	923	95	2008
0.46	545	849	93	2009
0.43	564	883	94	2010
0.41	573	978	93	2011
0.4	540	989	89	2012
0.55	523	728	93	2013
0.49	537	828	95	2014
0.44	557	951	95	2015
0.47	567	842	95	2016
0.5	536	793	94	2017


الجدول 20. المعايير الاحصائية لمحصول الطماطة

Interpretation	Value	Statistical standards
Good	0.885	r
Poor	0.492	RMSE
Very Good	24.169	CV
Poor	-6.216	EF
Poor	0.461	D

*بأستخدام المعادلات (1,2,3,4,5).

5. تطبيق برنامج «AquaCrop» والسيناريوهات المعتمدة المدروسة للتغيرات المناخية

الشكل 8. مخطط تركيز CO₂ حسب أربعة سيناريوهات (RCP)



وتمثل RCP's مجالاً واسعاً من المخرجات المناخية وكل ملف من RCP ينتج من تركيبة مختلفة من السياسات الاقتصادية والتكنولوجية.

وقد تم استخدام البيانات المناخية المتوقعة من النماذج (CNRM, GFDL, EC_EARTH) مع ثلاث ملفات مختلفة لتركيز الـ CO₂ السنوي لتقدير غلة المحاصيل (الحنطة والطماطة) في السنوات المستقبلية.

- RCP 4.5 بتركيز CO₂ سنوي متزايد (RCP 4.5) (CO₂).
- RCP 8.5 بتركيز CO₂ سنوي متزايد (RCP8.5 CO₂).
- قيمة تركيز CO₂ ثابت عند ((350 ppm بدءاً من عام 1985.

إن السيناريو مجموعة من الشروط التي تمثل ظروفاً مستقبلية مختلفة. وتستخدم السيناريوهات في أحيان كثيرة لتقدير النتائج المحتملة في المستقبل، واستعداد الأفراد والمؤسسات لها، أو استجابتهم إليها. على سبيل المثال، يستخدم رجال الأعمال السيناريوهات لتقرير ما إذا كانت بعض الاستراتيجيات مناسبة أم لا.

وفي مجال المناخ تستخدم السيناريوهات بسبب حالة عدم التأكد الكبيرة في تغير المناخ على المستوى الإقليمي. ويعنى بالمناخ الإقليمي، المناخ على مستوى شبه قارة، أو على مستوى منطقة أو بلد. وعلى الرغم من أن درجة الحرارة سترتفع في مناطق عديدة من العالم، إلا أن تغيرات هامة في المناخ كالهطول، غير مؤكدة في كثير من المناطق. وحتى في حالة معرفة اتجاه التغير المناخي تظل هناك درجة من عدم التأكد في شدته ومداه وتوقيتته والاتجاه الذي سيسلكه. ولذا تساعدنا السيناريوهات في فهم تغير المناخ الإقليمي واستجابة الأنظمة البيئية له.

وتوجد نماذج مختلفة للتنبؤ بالبيانات المناخية المستقبلية وفقاً للتغيرات المناخية المتوقعة مثل CNRM, GFDL, EC_EARTH.

توجد أربعة ملفات لـ CO₂ مختلفة من RCP's (Representative concentration (Pathway's موجودة في قاعدة بيانات البرنامج وهذه الملفات هي RCP 2.6 CO₂, RCP 4.5 CO₂, RCP 6.0 CO₂, RCP 8.5 CO₂).

6. نتائج الدراسة

التغيرات المناخية المتوقعة في منطقة الدراسة:

RCP 4.5. ويتناقص المطر السنوي والمطر الموسمي عند النموذج EC-Earth لكل من السيناريو RCP 4.5 و RCP 8.5، كما يتزايد المطر السنوي والموسمي بشكل بسيط عند النموذج CNRM-CM5 ضمن سيناريو RCP 4.5 ويتناقص عند السيناريو RCP 8.5. في حين كانت تغيرات درجات الحرارة العظمى والصغرى أعلى خلال فترة (2040-2050) منه للفترة (2020-2030) مقارنةً بفترة الاساس لكل من السيناريو RCP 4.5 و RCP 8.5 معاً.

يبين كل من جدول (21 و22) زيادة في كل من كميات المطر السنوي والمطر الموسمي عند فترة منتصف القرن ونهاية القرن لكل من السيناريو RCP 4.5 و RCP 8.5 عند النموذج GFDL-ESM2M، مع زيادة واضحة خلال فترة (2040-2050) مقارنةً بفترة الاساس عند السيناريو

الجدول 21. التغيرات المناخية المتوقعة للهطول المطري والحرارة الصغرى والعظمى للفترتين (2020-2030) و(2040-2050) مقارنة بفترة الاساس (1985-2005) للنماذج EC-Earth, CNRM-CM5, GFDL-ESM2M وفقاً للسيناريو RCP4.5 لمحصول الحنطة

2050-2040	2030-2020	Parameter
CM5-CNRM		
+ 10.8	+ 18.3	Rain (mm), Annual
-8.9	+23.3	Rain (mm), Seasonal
1.3	0.6	Maximum temperature(°C)
1.2	0.6	Minimum temperature (°C)
Earth-EC		
-16.8	-7.9	Rain (mm), Annual
-23.6	-12.2	Rain (mm), Seasonal
1.4	0.5	Maximum temperature(°C)
1.1	0.4	Minimum temperature (°C)
ESM2M-GFDL		
+ 43.9	+ 25.1	Rain (mm), Annual
+ 40.4	+ 25.1	Rain (mm), Seasonal
0.7	0.4	Maximum temperature(°C)
0.7	0.4	Minimum temperature (°C)

الجدول 22. التغيرات المناخية المتوقعة للهطول المطري والحرارة الصغرى والعظمى للفترتين (2020-2030) و(2040-2050) مقارنة بفترة الاساس (1985-2005) للنماذج EC-Earth, CNRM-CM5, GFDL-ESM2M وفقاً للسيناريو RCP8.5 لمحصول الحنطة

2050-2040	2030-2020	Parameter
CM5-CNRM		
-3.4	-5.1	Rain (mm), Annual
-7.1	-6.6	Rain (mm), Seasonal
1.4	0.7	Maximum temperature(°C)
1.2	0.7	Minimum temperature (°C)
Earth-EC		
-4.7	-1.4	Rain (mm), Annual
-19.9	-2.8	Rain (mm), Seasonal
1.6	0.7	Maximum temperature(°C)
1.3	0.6	Minimum temperature (°C)
ESM2M-GFDL		
+ 21.2	+ 24.5	Rain (mm), Annual
-3.2	+ 18.2	Rain (mm), Seasonal
1.4	0.6	Maximum temperature(°C)
1.3	0.6	Minimum temperature (°C)

2040-2050 عند ثبات تركيز CO₂ بسبب تزايد درجات الحرارة خلال موسم النمو عند السيناريو RCP4.5.

ويبين جدول (25) انه عند ثبات تركيز CO₂ فان مقدار كل من التبخر- النتح المرجعي والتبخر- نتح الفعلي ينخفض مع الزمن خلال فترة المحاكاة للسيناريو RCP4.5، إذ بلغت أعلى قيمة للتبخر- نتح المرجعي خلال فترة الاساس 379.9 (مم) والتبخر- نتح الفعلي 279.6 (مم)، وبلغت أقل قيمة خلال الفترة 2040-2050 مسجلة 357.2 و271.9 (مم) لكل من التبخر- نتح المرجعي والتبخر- نتح الفعلي، على التوالي. رغم زيادة درجات الحرارة إلا أن انخفاض طول موسم النمو هو الذي أدى إلى انخفاض بمعدلات التبخر- نتح لمحصول الحنطة.

في حين يبين جدول (26) زيادة الإنتاجية المائية لمحصول الحنطة خلال فترة المحاكاة عند ثبات تركيز CO₂ عند السيناريو RCP4.5 بالمقارنة مع فترة الاساس إذ سجلت أعلى قيمة للإنتاجية المائية عند الفترة 2040-2050 فبلغت 0.9 (كغم/م³).

أثر التغيرات المناخية على محصول الحنطة

نتائج تطبيق السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز ثاني أكسيد الكربون:

يبين جدول (23) انخفاض الإنتاجية عند السيناريو RCP 4.5 لحالة ثبات تركيز CO₂ عند مقارنة فترة الاساس مع فترتي 2020-2030 و2040-2050 وكذلك بالنسبة للتغير النسبي مع وجود فروق معنوية بين الإنتاجية خلال فترة الاساس وفترة المحاكاة، إذا إن أعلى قيمة للإنتاجية سجلت عند فترة الاساس والبالغة 2.36 (طن/هكتار) خلال فترة المحاكاة.

كما يبين جدول (24) إن أطول فترة نمو سجلت عند فترة الاساس 139.2 (يوم)، ثم بدء طول موسم النمو بالتناقص خلال فترة المحاكاة ليسجل 134.8 (يوم) خلال الفترة 2020-2030 و130.4 (يوم) خلال الفترة

الجدول 23. متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من أجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
	2.36	الإنتاج في سنة الأساس (طن/هكتار)
-0.06	-0.03	التغير المطلق (طن/هكتار)
-2.54	-1.23	التغير النسبي (%)
3.6E-04**	4.9E-02**	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 24. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من أجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
130.4	134.8	139.2	طول موسم النمو

الجدول 25. التبخر- التبخر- التبخ المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من أجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
357.2	366.2	379.9	التبخر المرجعي (مم)
271.9	279.4	279.6	التبخر الفعلي (مم)

الجدول 26. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من أجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
0.9	0.8	0.8	الإنتاجية المائية (كغم/م ³)

على زيادة الإنتاجية، كما نلاحظ وجود أي فرق معنوي واضحة للإنتاجية خلال فترة المحاكاة بالمقارنة مع فترة الأساس.

كما يبين جدول (28) أن طول موسم النمو انخفض عند المقارنة بين فترة الأساس والفترة 2020-2030 والفترة 2040-2050، إذ سجل أعلى فترة نمو لمحصول الحنطة خلال فترة الأساس بلغ 139.2 (يوم) بسبب زيادة درجات الحرارة عند السيناريو RCP 4.5.

نتائج تطبيق السيناريو RCP4.5 لحالة تزايد تركيز ثاني أكسيد الكربون:

وفي حالة زيادة تركيز CO₂ وعند نفس السيناريو RCP4.5 نلاحظ زيادة الإنتاجية لمحصول الحنطة كما مبينة في جدول (27) وبنسبة تغير مطلق تساوي 0.17 و 0.22 (طن/هكتار) خلال فترة المحاكاة وتغير نسبي بلغ 6.99% خلال فترة 2020-2030 و 9.17% خلال الفترة 2040-2050، إذ أن زيادة الـ CO₂ في الجو تعمل

الجدول 27. متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من أجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
	2.44	الإنتاج في سنة الأساس (طن/هكتار)
+0.22	+0.17	التغير المطلق (طن/هكتار)
+9.17	+6.99	التغير النسبي (%)
8.1E-16**	8.7E-12**	اختبار test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 28. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من أجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
130.4	134.8	139.2	طول موسم النمو

الجدول 29. التبخر- النتح المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من أجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
357.2	366.2	379.9	التبخر النتح المرجعي (مم)
268.8	277.9	281.7	التبخر نتح الفعلي (مم)

الجدول 30. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من أجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
1.0	0.9	0.7	الإنتاجية المائية (كغم/م ³)

ونلاحظ من خلال جدول (30) بأن الإنتاجية المائية ازدادت خلال فترة المحاكاة نتيجة زيادة الإنتاجية للمحصول التي ترجع بالاساس إلى زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو عند السيناريو RCP 4.5 فكانت أعلى قيمة للإنتاجية المائية خلال الفترة 2040-2050 مساوية 1 (كغم/م³).

ويبين جدول (29) أن مقدار التبخر- نتح المرجعي في حالة زيادة تركيز CO₂ انخفض خلال فترة المحاكاة سبب انخفاض فترة النمو للمحصول المزروع فبلغت أعلى قيمة له عند فترة الاساس مساوياً 379.9 (مم) في حين بلغت أقل قيمة للتبخر- نتح المرجعي عند الفترة 2040-2050 مساوياً 357.2 (مم)، كما نلاحظ أن مقدار التبخر- نتح الفعلي أيضاً انخفض خلال الفترة 2020-2030 والفترة 2040-2050 مقارنة بفترة الاساس عند السيناريو RCP 4.5.

طول موسم النمو خلال فترة الاساس أذ بلغت 139.3 (يوم) في حين بلغت 127.6 (يوم) خلال الفترة 2040-2050.

ويبين جدول (33) بأن كل من مقدار التبخر-نتح المرجعي والتبخر-نتح الفعلي أخذ بالانخفاض خلال فترة المحاكاة عند ثبات تركيز ثاني أكسيد الكربون CO₂ وضمن السيناريو RCP 8.5 أذ كانت أعلى قيمة مسجلة عند فترة الاساس والبالغة 379.3 و282.7 (مم) للتبخر-نتح المرجعي والتبخر-نتح الفعلي، على التوالي. وسجلت أقل قيمة عند الفترة 2040-2050 وقدرها 357.4 و269.4 (مم) لكل من التبخر-نتح المرجعي والتبخر-نتح الفعلي، على التوالي.

وفي جدول (34) نلاحظ بأن الإنتاجية المائية أخذت بالتزايد مقارنة بفترة الاساس عند الفترة 2040-2050 نتيجة لزيادة الانتاجية خلال هذه الفترة ومسجلة أعلى قيمة 0.9 (كغم/م³)، في حين كانت متساوية عند كل من فترة الاساس والفترة 2020-2030 عند ثبات تركيز ثاني أكسيد الكربون CO₂ وفي السيناريو RCP 8.5.

نتائج تطبيق السيناريو RCP 8.5 لحالة ثبات تركيز ثاني أكسيد الكربون:

عند حالة السيناريو RCP 8.5 وفي حالة ثبات تركيز ثاني أكسيد الكربون فنلاحظ في جدول (31) بأن متوسط الإنتاج لمحصول الحنطة أخذ بالتزايد خلال فترة الاساس ثم تناقص خلال الفترات اللاحقة للمحاكاة مع وجود فرق معنوي للإنتاجية، حيث بلغ الانخفاض خلال فترة 2020-2030 بتغيير نسبي قدرة -2.56%، أما في الفترة 2040-2050 نلاحظ ايضاً انخفاض الإنتاجية وبتغيير نسبي قدرة -3.65%، مع وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية 0.05 بين متوسط الإنتاج خلال فترة الاساس والفترة 2040-2050.

في حين يبين جدول (32) بأن طول موسم النمو لمحصول الحنطة أخذ بالتناقص خلال فترة المحاكاة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم الزراعي، فكانت أعلى قيمة

الجدول 31. متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.36		الإنتاج في سنة الأساس (طن/هكتار)
-0.09	-0.06	التغير المطلق (طن/هكتار)
-3.65	-2.56	التغير النسبي (%)
4.51E-05**	4.0E-03**	اختبار test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 32. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
127.6	132.3	139.3	طول موسم النمو

الجدول 33. التبخر-نتح المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
357.4	362.0	379.3	التبخر-نتح المرجعي (مم)
269.4	274.4	282.7	التبخر-نتح الفعلي (مم)

الجدول 34. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	الإنتاجية المائية (كغم/م ³)
0.9	0.8	0.8	

أقل فترة نمو للمحصول عند الفترة 2040-2050 مساوية لـ 127.6 (يوم).

في حين يبين جدول (37) بأن مقدار التبخر-نتح المرجعي والتبخر-نتح الفعلي أخذ بالانخفاض خلال فترة المحاكاة بسبب انخفاض طول موسم النمو للمحصول المزروع ليسجل أعلى قيمة خلال فترة الأساس 379.3 و 282.6 (مم) لكل من التبخر-نتح المرجعي والتبخر-نتح الفعلي، على التوالي عند السيناريو RCP8.5.

كما يوضح جدول (38) بأن مقدار الإنتاجية المائية لمحصول الحنطة أخذ بالتزايد خلال فترة المحاكاة ليسجل أعلى قيمة خلال الفترة 2040-2050 مساوية لـ 1.1 (كغم/م³) عند تزايد تركيز ثاني أوكسيد الكربون CO₂ وعند السيناريو RCP8.5 نتيجة لزايد الانتاجية للمحصول.

نتائج تطبيق السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز ثاني أوكسيد الكربون:

يبين جدول (35) بأن الإنتاجية أخذت بالتزايد عند السيناريو RCP8.5 في حالة زيادة تركيز ثاني أوكسيد الكربون CO₂ خلال فترة المحاكاة، فبلغت أعلى قيمة للإنتاجية عند الفترة 2040-2050 بتغير مطلق قدرة 0.37 (طن/هكتار) وتغير النسبي 15.08%، ونلاحظ وجود فرق معنوي بين الإنتاجية خلال فترة الأساس وبين الفترة 2020-2030 و 2040-2050 عند مستوى معنوية 0.05.

يبين جدول (36) بأن طول موسم النمو بلغ أعلى فترة خلال فترة الأساس 1985-2005 بمعدل 139.3 (يوم) ثم أخذ بالانخفاض خلال فترة المحاكاة عند السيناريو RCP8.5 وفي حالة زيادة تركيز ثاني أوكسيد الكربون ليسجل

الجدول 35. متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.44		الإنتاج في سنة الأساس (طن/هكتار)
+0.37	+0.26	التغير المطلق (طن/هكتار)
+15.08	+10.79	التغير النسبي (%)
9.81E-15**	1.63E-10**	اختبار test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 36. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	طول موسم النمو
127.6	132.3	139.3	

الجدول 37. التبخر- النتج المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040- 2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
357.4	362.0	379.3	التبخر النتج المرجعي (مم)
263.0	271.6	282.6	التبخر نتج الفعلي (مم)

الجدول 38. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
1.1	1.0	0.9	الإنتاجية المائية (كغم/م ³)

بمقدار 40% من الري الكلي، مما يبين تأثير التغيرات المناخية على الإنتاجية النباتية للمحصول خلال فترة المحاكاة.

كما مبينة في جدول (39) بأن نسبة الانخفاض في الإنتاجية خلال الفترة 2020-2030 كانت ذات تغيير مطلق ونسبي قدره 50.0 و-2.0 على التوالي. أما خلال الفترة 2040-2050 فبلغ الانخفاض بالإنتاجية كتغير مطلق ونسبي -0.18 و-8.0 على التوالي. ونلاحظ بوجود فرق معنوي واضح للفترتين بالمقارنة مع فترة الاساس 1985-2005 وعند مستوى معنوية قدرة 5%.

الشكل 9. التغيرات الحاصلة في إنتاجية الحنطة وفق تخفيض الري الى 20% و40% لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون



تأثير النقص في الموارد المائية المتاحة للري على إنتاجية محصول الحنطة

تخفيض الري 20% و40% من اجل السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

يبين شكل (9) انخفاض مقدار الإنتاجية خلال الفترة 2020-2030 بحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO₂ من اجل السيناريو RCP4.5 نتيجة خفض كميات مياه الري المضافة وبنسبة 20% من الري الكلي خلال تلك الفترة، وعند تخفيض الري وبنسبة 40% خلال الفترة 2040-2050 كذلك أدى إلى حدوث انخفاض واضح في الإنتاجية.

كما ونلاحظ أن إنتاجية محصول الحنطة من اجل السيناريو RCP8.5 بحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO₂ قد انخفضت خلال الفترة 2020-2030 نتيجة تخفيض الري بمعدل 20% من الري الكلي. أما خلال الفترة 2040-2050 فنلاحظ ايضاً انخفاض الإنتاجية وبشكل واضح جداً نتيجة انخفاض الري

كما نلاحظ من خلال جدول (41) أن مقدار التبخر- نتح الفعلي عند ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون من اجل السيناريو RCP4.5 اخذ بالانخفاض خلال فترة المحاكاة بالمقارنة مع فترة الاساس مع وجود انخفاض بالري عند 20% و40% من الري الكلي.

كما يبين جدول (42) أن مقدار التبخر- نتح الفعلي عند ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون من اجل السيناريو RCP8.5 اخذ بالانخفاض ايضاً خلال فترة المحاكاة بالمقارنة مع فترة الاساس مع وجود انخفاض بالري عند 20% وبدرجة اعلى عند تخفيض الري بنسبة 40% من الري الكلي.

يبين جدول (40) أن الانخفاض بالإنتاجية لحالة ثبات تركيز ثاني أكسيد الكربون CO₂ من اجل السيناريو RCP8.5 قد بلغ 0.0-8.0 و3.36% لكل من التغير المطلق والتغير النسبي، على التوالي خلال الفترة 2020-2030 عند الانخفاض بالامداد المائي بمقدار 20% من الري الكلي وانخفض بمقدار -0.22 و9.34% للتغير المطلق والتغير النسبي، على التوالي خلال الفترة 2040-2050 عند الانخفاض بالامداد المائي بمقدار 40% من الري الكلي، مع وجود فرق معنوي للإنتاجية خلال فترة المحاكاة وعند مستوى معنوية 5%.

الجدول 39. متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.36		الإنتاج في سنة الأساس (طن/هكتار)
40%	20%	نسبة التخفيض بالري
-0.18	-0.05	التغير المطلق (طن/هكتار)
-8.0	-2.0	التغير النسبي (%)
1.97E-06**	3.3E-03**	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 40. متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.36		الإنتاج في سنة الأساس (طن/هكتار)
40%	20%	نسبة التخفيض بالري
-0.22	-0.08	التغير المطلق (طن/هكتار)
-9.34	-3.36	التغير النسبي (%)
1.8E-08**	1.2E-03**	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 41. التبخر- النتح الفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ وعند تخفيض الري 20 و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
عند عجز مائي 20%			
----	277.4	279.6	التبخر نتح الفعلي (مم)
عند عجز مائي 40%			
251.7	277.4	279.6	التبخر نتح الفعلي (مم)

الجدول 42. التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO₂ وعند تخفيض الري 20% و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
عند عجز مائي 20%			
-----	272.5	282.7	التبخر نتج الفعلي (مم)
عند عجز مائي 40%			
247.2	272.5	282.7	التبخر نتج الفعلي (مم)

الجدول 43. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 لحالة ثبات غاز ثاني أوكسيد الكربون CO₂ وعند تخفيض الري 20% و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
عند عجز مائي 20%			
-----	134.8	139.2	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 4.5
-----	132.3	139.3	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 8.5
عند عجز مائي 40%			
130.4	134.8	139.2	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 4.5
127.6	132.3	139.3	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 8.5

0.873 (كغم/م³) للمحصول ويرجع هذا بالدرجة الاساسية لانخفاض مقدار التبخر- نتج المرجعي والتبخر- نتج الفعلي في زيادة الإنتاجية المائية.


الشكل 10. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس -1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون وعند تخفيض الري الى 20% و40%



يبين جدول (43) بأن طول موسم النمو بلغ أعلى فترة خلال فترة الاساس 1985-2005 بمعدل 139.2 و139.3 (يوم) للسيناريو RCP 4.5 والسيناريو RCP 8.5 على التوالي، ثم أخذ بالانخفاض خلال فترة المحاكاة لحالة ثبات تركيز ثاني أوكسيد الكربون لسيجل أقل فترة نمو للمحصول عند الفترة -2040-2050 مساوية لـ 130.4 عند السيناريو RCP4.5 و 127.6 (يوم) عند السيناريو RCP 8.5.

يبين شكل (10) زيادة بالإنتاجية المائية لمحصول الحنطة عند ثبات تركيز ثاني أوكسيد الكربون وكانت واضحة اكثر عند السيناريو RCP4.5 منه للسيناريو RCP8.5، اذا اعطت أعلى قيمة عند الفترة 2040-2050 بالمقارنة مع فترة الاساس ولحالة السيناريو RCP4.5 بلغت 10.87 (كغم/م³) رغم تخفيض الري بنسبة 40% من الري الكلي. كما وازدادت ايضا عند السناريو RCP8.5 ولحالة تخفيض الري عند 40% من الري الكلي حيث بلغت

الشكل 11. التغيرات الحاصلة في إنتاجية الحنطة وفق تخفيض الري الى 20% و40% لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون



فترة الاساس 1985-2005 وعند مستوى معنوية قدرة 5%.

كما ويبين جدول (45) أن زيادة الإنتاجية لحالة زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون CO₂ من اجل السيناريو RCP8.5 قد بلغ 0.24 و9.97% لكل من التغير المطلق والتغير النسبي، على التوالي خلال الفترة 2020-2030 وازداد بمقدار 0.323 و9.37% للتغير المطلق والتغير النسبي، على التوالي خلال الفترة 2040-2050 عند الانخفاض بالامداد المائي بمقدار 40% من الري الكلي، مع وجود فرق معنوي عالي جداً للإنتاجية خلال فترة المحاكاة وعند مستوى معنوية 5%.

تخفيض الري 20% و40% من اجل السيناريو RCP8.5 و RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

يبين شكل (11) زيادة الإنتاجية لمحصول الحنطة خلال الموسم الزراعي مع تخفيض الري بمقدار 20% و40% من الري الكلي خلال الفترة 2020-2030 حيث بلغت الإنتاجية 2.69 (طن/هكتار) بالمقارنة مع فترة الأساس مع تزايد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ من اجل السيناريو RCP4.5 والسيناريو RCP 8.5 أيضاً.

كما نلاحظ زيادة إنتاجية محصول الحنطة خلال الفترة 2040-2050 ايضاً مع تخفيض الري بمقدار 20% و40% من الري الكلي حيث بلغت الإنتاجية 2.67 (طن/هكتار) بالمقارنة مع فترة الاساس مع تزايد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ من اجل السيناريو RCP4.5 والسيناريو RCP8.5 ايضاً.

وكما موضحة بجدول (44) بأن نسبة الزيادة في الإنتاجية خلال الفترة 2020-2030 من اجل السيناريو RCP4.5 ذات تغير مطلق ونسبي قدرة 0.28 و11.58%، على التوالي. أما خلال الفترة 2040-2050 فبلغت الزيادة بالإنتاجية كتغير مطلق ونسبي 0.26 و10.72%، على التوالي. ونلاحظ بوجود فرق معنوي عالي للفترتين بالمقارنة مع

الجدول 44. متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20% و40% من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.44		الإنتاج في سنة الأساس (طن/هكتار)
40%	20%	نسبة التخفيض بالري
+0.23	+0.25	التغير المطلق (طن/هكتار)
+9.5	+10.4	التغير النسبي (%)
3.2E-08**	4.7E-11**	أختبار الـ T-test

* غير معنوي. ** معنوي.

الجدول 45. متوسط إنتاجية الحنطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20% و40% من أجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
	2.44	الإنتاج في سنة الأساس (طن/هكتار)
40%	20%	نسبة التخفيض بالري
+0.23	+0.24	التغير المطلق (طن/هكتار)
+9.4	10.0+	التغير النسبي (%)
5.4E-08**	1.5E-09**	أختبار الـ test-T
* غير معنوي. ** معنوي.		

الجدول 46. التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من أجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ وعند تخفيض الري 20% و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
عند عجز مائي 20%			
-----	276.2	281.0	التبخر نتج الفعلي (مم)
عند عجز مائي 40%			
250.1	276.2	281.0	التبخر نتج الفعلي (مم)

الجدول 47. التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من أجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ وعند تخفيض الري 20% و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
عند عجز مائي 20%			
-----	270.2	282.6	التبخر نتج الفعلي (مم)
عند عجز مائي 40%			
244.9	270.2	282.6	التبخر نتج الفعلي (مم)

الجدول 48. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من أجل السيناريو RCP4.5 و RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ وعند تخفيض الري 20% و40%

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	فترة الأساس (1985-2005)	
عند عجز مائي 20%			
-----	134.8	139.2	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 4.5
-----	132.3	139.3	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 8.5
عند عجز مائي 40%			
130.4	134.8	139.2	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 4.5
127.6	132.3	139.3	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 8.5


قيمة عند الفترة 2040-2050 بالمقارنة مع فترة الأساس بلغت 1.1 (كغم/م³)، رغم تخفيض الري بنسبة 40% من الري الكلي. نتيجة لانخفاض مقدار التبخر- نتح في زيادة الإنتاجية المائية.

أثر التغيرات المناخية على محصول الطماطة

يبين الجدول (49) التغيرات المناخية لحالة السيناريو RCP 4.5 حيث نلاحظ زيادة في كل من كميات الامطار السنوية الموسمية عند فترة منتصف القرن للنموذج CNRM اما في نهاية القرن فكانت الزيادة في الامطار السنوية فقط اما عند النموذج EC-Earth فنلاحظ انخفاض في الامطار الموسمية والسنوية خلال فترة منتصف القرن اما فترة نهاية القرن فالزيادة في الامطار الموسمية فقط. وفي حالة النموذج GFDL الزيادة في الامطار الموسمية والسنوية لفترة منتصف ونهاية القرن. في حين كانت تغيرات درجات الحرارة العظمى والصغرى أعلى خلال فترة 2040-2050 منه للفترة 2020-2030 مقارنة بفترة الأساس في حالة السيناريو RCP 4.5.

كما يبين جدول (50) انخفاض في كميات الامطار السنوية الموسمية عند فترة منتصف القرن للنموذج CNRM اما في نهاية القرن فان الانخفاض في الامطار السنوية والزيادة في الامطار الموسمية وفي النموذج EC-Earth فهناك انخفاض في الامطار السنوية وزيادة في الامطار الموسمية في فترة منتصف القرن وانخفاض في الامطار الموسمية والسنوية في نهاية القرن. وفي النموذج GFDL فكانت زيادة في الامطار الموسمية والسنوية لفترة منتصف ونهاية القرن. لحالة السيناريو RCP 4.5. في حين كانت تغيرات درجات الحرارة العظمى والصغرى أعلى خلال فترة 2040-2050 منه للفترة 2020-2030 مقارنة بفترة الأساس.

الشكل 12. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس-1986 و2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من أجل لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون وعند تخفيض الري الى 20% و40% السيناريو RCP4.5 وRCP8.5



كما نلاحظ من خلال جدول (46) أن مقدار التبخر- نتح الفعلي عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون اخذ بالانخفاض خلال فترة المحاكاة بالمقارنة مع فترة الأساس مع وجود انخفاض بالري عند 20% و40% من الري الكلي.

كما يبين جدول (47) أن مقدار التبخر- نتح الفعلي عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون من أجل السيناريو RCP8.5 اخذ بالانخفاض أيضاً خلال فترة المحاكاة بالمقارنة مع فترة الأساس مع وجود انخفاض بالري عند 20% وبدرجة أعلى عند تخفيض الري بنسبة 40% من الري الكلي حيث بلغ 270.2 و244.9 مم.

كما يبين جدول (48) أن طول موسم النمو لمحصول الحنطة عند تزايد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون من أجل السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 اخذ بالانخفاض خلال فترة المحاكاة بالمقارنة مع فترة الأساس.

يبين شكل (12) زيادة الإنتاجية المائية لمحصول الحنطة عند زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون من أجل السيناريو RCP4.5 وRCP8.5، وسجلت أعلى

الجدول 49. يبين التغيرات المناخية المتوقعة للهطول المطري والحرارة الصغرى والعظمى للفترتين (2020-2030) و(2040-2050) مقارنة بفترة الاساس (1985-2005) للنماذج EC-Earth, CNRM-CM5, GFDL-ESM2M وفقاً للسيناريو RCP4.5 لمحصول الطماسة

2050-2040	2030-2020	Parameter
CM5-CNRM		
+10.8	+18.3	Rain (mm), Annual
-6.9	+2.4	Rain (mm), Seasonal
1.3	0.6	Maximum temperature(°C)
1.2	0.6	Minimum temperature (°C)
Earth-EC		
-16.8	-7.9	Rain (mm), Annual
+2.0	-9.2	Rain (mm), Seasonal
1.4	0.5	Maximum temperature(°C)
1.1	0.4	Minimum temperature (°C)
ESM2M-GFDL		
+43.9	+25.1	Rain (mm), Annual
+19.3	+13.8	Rain (mm), Seasonal
0.7	0.4	Maximum temperature(°C)
0.7	0.4	Minimum temperature (°C)

الجدول 50. يبين التغيرات المناخية المتوقعة للهطول المطري والحرارة الصغرى والعظمى للفترتين (2020-2030) و(2040-2050) مقارنة بفترة الاساس (1985-2005) للنماذج EC-Earth, CNRM-CM5, GFDL-ESM2M وفقاً للسيناريو RCP 8.5 لمحصول الطماسة

2050-2040	2030-2020	Parameter
CM5-CNRM		
-3.4	-5.1	Rain (mm), Annual
+5.6	-12.7	Rain (mm), Seasonal
1.4	0.7	Maximum temperature(°C)
1.2	0.7	Minimum temperature (°C)
Earth-EC		
-4.7	-1.4	Rain (mm), Annual
-7.9	+13.0	Rain (mm), Seasonal
1.6	0.7	Maximum temperature(°C)
1.3	0.6	Minimum temperature (°C)
ESM2M-GFDL		
+21.2	+24.5	Rain (mm), Annual
+1.3	+15.2	Rain (mm), Seasonal
1.4	0.6	Maximum temperature(°C)
1.3	0.6	Minimum temperature (°C)

الحرارة خلال موسم النمو عند السيناريو RCP4.5.

كما يبين جدول (53) انه عند ثبات تركيز CO₂ فان مقدار كل من التبخر- النتح المرجعي والتبخر- نتح الفعلي ينخفض مع الزمن خلال فترة المحاكاة للسيناريو RCP4.5، إذ بلغت أعلى قيمة للتبخر- نتح المرجعي خلال فترة الاساس 706.7 (مم) والتبخر- نتح الفعلي 517.4 (مم)، وبلغت أقل قيمة خلال الفترة 2040-2050 مسجلة 697.1 و515.3 (مم) لكل من التبخر- نتح المرجعي والتبخر- نتح الفعلي، على التوالي. رغم زيادة درجات الحرارة الا أن انخفاض طول موسم النمو هو الذي أدى إلى انخفاض التبخر- نتح لمحصول الطماطة.

في حين يبين جدول (54) ثبات الإنتاجية المائية لمحصول الطماطة خلال فترة المحاكاة عند ثبات تركيز CO₂ عند السيناريو RCP4.5 بالمقارنة مع فترة الاساس.

نتائج تطبيق السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز ثاني أكسيد الكربون:

يبين جدول (51) بانخفاض الإنتاجية عند السيناريو RCP 4.5 لحالة ثبات تركيز CO₂ عند مقارنة فترة الاساس مع فترتي 2020-2030 و2040-2050 وكذلك بالنسبة للتغير النسبي مع وجود فروق معنوية بين الإنتاجية خلال فترة الاساس وفترة المحاكاة، إذا إن أعلى قيمة للإنتاجية سجلت عند فترة الاساس والبالغة 2.43 (طن/هكتار) خلال فترة المحاكاة.

يبين جدول (52) إن أطول فترة نمو سجلت عند فترة الاساس 92.6 (يوم)، ثم بدء طول موسم النمو بالتناقص خلال فترة المحاكاة ليسجل 91.6 (يوم) خلال الفترة 2020-2030 و91.3 (يوم) خلال الفترة 2040-2050 عند ثبات تركيز CO₂ بسبب تزايد درجات

الجدول 51. متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.43		الإنتاج في فترة الأساس (طن/هكتار)
-0.13	-0.03	التغير المطلق (طن/هكتار)
-5.34	-1.23	التغير النسبي (%)
*0.06	*0.49	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 52. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
91.3	91.6	92.6	طول موسم النمو

الجدول 53. التبخر- النتح المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
697.1	701.4	706.7	التبخر النتح المرجعي (مم)
515.3	517.0	517.4	التبخر نتح الفعلي (مم)

الجدول 54. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	فترة الأساس (1985-2005)	الإنتاجية المائية (كغم/م ³)
0.5	0.5	0.5	

ويبين جدول (57) انه عند زيادة تركيز CO₂ فان مقدار كل من التبخر- النتح المرجعي والتبخر- نتح الفعلي ينخفض مع الزمن خلال فترة المحاكاة للسيناريو RCP4.5، إذ بلغت أعلى قيمة للتبخر- نتح المرجعي خلال فترة الاساس 706.8 (مم) والتبخر- نتح الفعلي 517.3 (مم)، وبلغت أقل قيمة خلال الفترة -2040-2050 مسجلة 697.1 و510.7 (مم) لكل من التبخر- نتح المرجعي والتبخر- نتح الفعلي، على التوالي. رغم زيادة درجات الحرارة الا أن انخفاض طول موسم النمو هو الذي أدى إلى انخفاض التبخر- نتح لمحصول الطماطة.

في حين يبين جدول (58) زيادة الانتاجية المائية لمحصول الطماطة خلال فترة المحاكاة عند زيادة تركيز CO₂ عند السيناريو RCP4.5 بالمقارنة مع فترة الاساس إذ سجلت أعلى قيمة للإنتاجية المائية عند الفترة 2040-2050 فبلغت 0.6 (كغم/م³).

نتائج تطبيق السيناريو RCP4.5 لحالة تزايد تركيز ثاني أوكسيد الكربون:

أذ يبين جدول (55) زيادة الإنتاجية عند السيناريو RCP 4.5 عند زيادة تركيز CO₂ عند مقارنة فترة الاساس مع فترتي 2020-2030 و2040-2050 وكذلك بالنسبة للتغير النسبي مع وجود فروق معنوية عالية بين الإنتاجية خلال فترة الاساس وفترة المحاكاة، إذا إن أعلى قيمة للإنتاجية سجلت عند الفترتين 2020-2030 و-2040-2050 والبالغة 2.5 (طن/هكتار) خلال فترة المحاكاة.

كما يبين جدول (56) إن أطول فترة نمو سجلت عند فترة الاساس 92.6 (يوم)، ثم بدء طول موسم النمو بالتناقص خلال فترة المحاكاة ليسجل 91.6 (يوم) خلال الفترة 2020-2030 و91.3 (يوم) خلال الفترة 2040-2050 عند زيادة تركيز CO₂ بسبب تزايد درجات الحرارة خلال موسم النمو عند السيناريو RCP4.5.

الجدول 55. متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	الإنتاج في فترة الأساس (طن/هكتار)
	2.5	
+0.32	+0.29	التغير المطلق (طن/هكتار)
+12.8	+11.6	التغير النسبي (%)
**3.6E-04	**2.6E-06	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 56. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	طول موسم النمو
91.3	91.6	92.6	

الجدول 57. التبخر- النتج المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	
697.1	701.4	706.8	التبخر النتج المرجعي (مم)
510.7	514.4	517.3	التبخر نتج الفعلي (مم)

الجدول 58. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	فترة الأساس (1985- 2005)	
0.6	0.5	0.5	الإنتاجية المائية (كغم/م ³)

ويبين جدول (61) انه عند ثبات تركيز CO₂ فان مقدار كل من التبخر- النتج المرجعي والتبخر- نتج الفعلي ينخفض مع الزمن خلال فترة المحاكاة للسيناريو RCP8.5، إذ بلغت أعلى قيمة للتبخر- نتج المرجعي خلال فترة الاساس 706.2 (مم) والتبخر- نتج الفعلي 517.6 (مم)، وبلغت أقل قيمة خلال الفترة 2040-2050 مسجلة 694.6 و512.7 (مم) لكل من التبخر- نتج المرجعي والتبخر- نتج الفعلي، على التوالي. رغم زيادة درجات الحرارة إلا أن انخفاض طول موسم النمو هو الذي أدى إلى انخفاض التبخر- نتج لمحصول الطماطة.

في حين يبين جدول (62) انخفاض الإنتاجية المائية لمحصول الطماطة خلال فترة المحاكاة عند ثبات تركيز CO₂ عند السيناريو RCP8.5 بالمقارنة مع فترة الاساس إذ سجلت أعلى قيمة للإنتاجية المائية عند الفترة 1986-2005 فبلغت 0.5 (كغم/م³).

نتائج تطبيق السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز ثاني أوكسيد الكربون:

اذ يبين جدول (59) بانخفاض الإنتاجية عند السيناريو RCP8.5 عند ثبات تركيز CO₂ عند مقارنة فترة الاساس مع فترتي 2020-2030 و2040-2050 وكذلك بالنسبة للتغير النسبي مع عدم وجود فروق معنوية بين الإنتاجية خلال فترة الاساس وفترة المحاكاة، إذا إن أعلى قيمة للإنتاجية سجلت عند فترة الاساس والبالغة 2.43 (طن/هكتار) خلال فترة المحاكاة.

كما يبين جدول (60) إن أطول فترة نمو سجلت عند فترة الاساس 92.6 (يوم)، ثم بدء طول موسم النمو بالتناقص خلال فترة المحاكاة ليسجل 91.4 (يوم) خلال الفترة 2020-2030 و90.8 (يوم) خلال الفترة 2040-2050 عند ثبات تركيز CO₂ بسبب تزايد درجات الحرارة خلال موسم النمو عند السيناريو RCP8.5.

الجدول 59. متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.43		الإنتاج في فترة الأساس (طن/هكتار)
-0.17	-0.15	التغير المطلق (طن/هكتار)
-7	-6.17	التغير النسبي (%)
*0.06	*0.099	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 60. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من أجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	طول موسم النمو
90.8	91.4	92.6	

الجدول 61. التبخر- النتج المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من أجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	التبخر- النتج المرجعي (مم)
694.6	702.1	706.2	
512.7	518.0	517.6	التبخر- نتج الفعلي (مم)

الجدول 62. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من أجل السيناريو RCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	فترة الأساس (1985- 2005)	الإنتاجية المائية (كغم/م ³)
0.4	0.4	0.5	

درجات الحرارة خلال موسم النمو عند السيناريو RCP8.5.

ويبين جدول (65) انه عند زيادة تركيز CO₂ فان مقدار كل من التبخر- النتج المرجعي والتبخر- نتج الفعلي ينخفض مع الزمن خلال فترة المحاكاة للسيناريو RCP8.5، إذ بلغت أعلى قيمة للتبخر- نتج المرجعي خلال فترة الأساس 706.2 (مم) والتبخر- نتج الفعلي 516.8 (مم)، وبلغت أقل قيمة خلال الفترة 2040-2050 مسجلة 694.6 و503.2 (مم) لكل من التبخر- نتج المرجعي والتبخر- نتج الفعلي، على التوالي. رغم زيادة درجات الحرارة إلا أن انخفاض طول موسم النمو هو الذي أدى إلى انخفاض التبخر- نتج لمحصول الطماطة.

في حين يبين جدول (66) زيادة الإنتاجية المائية لمحصول الطماطة خلال فترة المحاكاة عند زيادة تركيز CO₂ عند السيناريو RCP8.5 بالمقارنة مع فترة الأساس إذ سجلت أعلى قيمة للإنتاجية المائية عند الفترة 2040-2050 فبلغت 0.6 (كغم/م³).

نتائج تطبيق السيناريو RCP8.5 لحالة تزايد تركيز ثاني أكسيد الكربون:

يبين جدول (63) زيادة بالإنتاجية لحالة السيناريو RCP 8.5 عند زيادة تركيز CO₂ عند مقارنة فترة الأساس مع فترتي 2020-2030 و2040-2050 وكذلك بالنسبة للتغير النسبي مع عدم وجود فروق معنوية بين الإنتاجية خلال فترة الأساس والفترة 2020-2030، في حين يوجد فرق معنوي بين فترة الأساس والفترة 2040-2050. إذا إن أعلى قيمة للإنتاجية سجلت عند الفترة 2040-2050 والبالغة 2.51 (طن/هكتار) خلال فترة المحاكاة.

كما يبين جدول (64) إن أطول فترة نمو سجلت عند فترة الأساس 92.6 (يوم)، ثم بدء طول موسم النمو بالتناقص خلال فترة المحاكاة ليسجل 91.4 (يوم) خلال الفترة 2020-2030 و90.9 (يوم) خلال الفترة 2040-2050 عند زيادة تركيز CO₂ بسبب تزايد

الجدول 63. متوسط إنتاجية الطماعة والتغير المتوقع في الإنتاجية من أجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	الإنتاج في فترة الأساس (طن/هكتار)
	2.51	
-0.17	+0.17	+0.3
-7	+6.77	+11.95
*0.06	*0.1	**3.8E-03

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 64. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من أجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	طول موسم النمو
90.9	91.4	92.6	

الجدول 65. التبخر-التح المرجعي والفعلي خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من أجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1986	التبخر المرجعي (مم)
694.6	702.1	706.2	
503.2	514.3	516.8	التبخر الفعلي (مم)

الجدول 66. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 1986-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 من أجل السيناريو RCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	فترة الأساس (1985-2005)	الإنتاجية المائية (كغم/م ³)
0.6	0.5	0.5	


يبين شكل (13) انخفاض الإنتاجية خلال الفترة 2030-2020 بحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ في حالة السيناريو RCP4.5 نتيجة خفض كميات مياه الري المضافة وبنسبة 20% من الري الكلي خلال تلك الفترة. وفي حالة تخفيض الري وبنسبة 40% خلال الفترة 2050-2040 حدث انخفاض واضح في الإنتاجية.

كما ونلاحظ أن إنتاجية محصول الطماعة في حالة السيناريو RCP8.5 قد انخفضت خلال الفترة 2020-2030 نتيجة تخفيض الري بمعدل 20% من الري الكلي. أما خلال

تأثير النقص في الموارد المائية المتاحة للري على إنتاجية محصول الطماعة

تخفيض الري 20 و40% من أجل السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

الشكل 13. التغيرات الحاصلة في إنتاجية الطماطة وفق تخفيض الري الي 20% و40% لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون



ويبين جدول (69) انه عند زيادة تركيز CO₂ فان مقدار التبخر-نتح الفعلي ينخفض مع الزمن خلال فترة المحاكاة للسيناريو RCP4.5، إذ بلغت أعلى قيمة خلال فترة الاساس للتبخر-نتح الفعلي 517.4 (مم)، وبلغت أقل قيمة خلال الفترة 2040-2050 مسجلة 397.1 (مم)، رغم زيادة درجات الحرارة الا أن انخفاض طول موسم النمو هو الذي أدى إلى انخفاض التبخر-نتح لمحصول الطماطة.

الجدول 67. متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20% و40% من اجل السيناريو RCP4.5 لحالة ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.43		الإنتاج في فترة الأساس (طن/هكتار)
40%	20%	نسبة التخفيض بالري
-0.83	-0.23	التغير المطلق (طن/هكتار)
-34.15	-6.49	التغير النسبي (%)
**1.6E-13	**3.3E-05	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 68. متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20% و40% في حالة السيناريو RCP8.5 عند ثبات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.43		الإنتاج في فترة الأساس (طن/هكتار)
40%	20%	نسبة التخفيض بالري
-0.85	-0.34	التغير المطلق (طن/هكتار)
-34.98	-14	التغير النسبي (%)
**5.2E-11	**2E-04	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الفترة 2040-2050 فنلاحظ أيضاً انخفاض الإنتاجية وبشكل واضح جداً مع انخفاض الري بمقدار 40% من الري الكلي أترعلى الانخفاض بالإنتاجية، مما يبين تأثير التغيرات المناخية على الإنتاجية النباتية للمحصول خلال فترة المحاكاة.

كما مبينة في جدول (67) بأن نسبة الانخفاض في الإنتاجية خلال الفترة 2020-2030 كانت ذات تغير مطلق ونسبي قدرة 0.23%-6.49%، على التوالي. أما خلال الفترة 2040-2050 فبلغ الانخفاض بالإنتاجية كتغير مطلق ونسبي 0.83%-34.15%، على التوالي. ونلاحظ بوجود فرق معنوي واضح للفترتين بالمقارنة مع فترة الاساس 1985-2005 وعند مستوى معنوية قدرة 5%.

كما مبينة في جدول (68) بأن نسبة الانخفاض في الإنتاجية خلال الفترة 2020-2030 كانت ذات تغير مطلق ونسبي قدرة 0.34%-14%، على التوالي. أما خلال الفترة 2040-2050 فبلغ الانخفاض بالإنتاجية كتغير مطلق ونسبي 0.85%-34.98%، على التوالي. ونلاحظ بوجود فرق معنوي واضح للفترتين بالمقارنة مع فترة الاساس 1985-2005 وعند مستوى معنوية قدرة 5%.

الجدول 69. التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 2005-1985 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 في حالة السيناريو RCP4.5 عند ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO₂ وتخفيض الري 20 و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1985	
عند عجز مائي 20%			
-----	469.6	517.4	التبخر نتج الفعلي (مم)
عند عجز مائي 40%			
397.1	469.6	517.4	التبخر نتج الفعلي (مم)


الجدول 70. التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 2005-1985 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 في حالة السيناريو RCP8.5 عند ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون CO₂ وتخفيض الري 20 و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1985	
عند عجز مائي 20%			
-----	463.6	517.6	التبخر نتج الفعلي (مم)
عند عجز مائي 40%			
397.1	463.6	517.6	التبخر نتج الفعلي (مم)

المحاكاة عند ثبات وزيادة تركيز CO₂ بسبب تزايد درجات الحرارة خلال موسم النمو عند السيناريو RCP8.5.

تخفيض الري 20 و40% من اجل

الشكل 14. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 2005-1985 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 في حالة السيناريو RCP4.5 و RCP8.5 عند ثبات تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون و تخفيض الري الى 20 و40%



ويبين جدول (70) انه عند زيادة تركيز CO₂ فان مقدار كل من التبخر- النتج الفعلي ينخفض مع الزمن خلال فترة المحاكاة للسيناريو RCP8.5، إذ بلغت أعلى قيمة للتبخر- نتج الفعلي 517.6 (مم)، وبلغت أقل قيمة خلال الفترة 2040-2050 مسجلة 397.1 (مم)، على الرغم من زيادة درجات الحرارة الا أن انخفاض طول موسم النمو هو الذي أدى إلى انخفاض التبخر- نتج لمحصول الطماطة.

يبين شكل (14) انخفاض بالإنتاجية المائية لمحصول الطماطة عند ثبات تركيز ثاني أوكسيد الكربون وتخفيض الري بنسبة 20% خلال الفترة 2020-2030 وبنسبة 40% خلال الفترة 2040-2050 وكان الانخفاض واضح أكثر عند السيناريو RCP8.5 منه للسيناريو RCP4.5، اذا اعطت اكبر قيمة للانخفاض في حالة السيناريو RCP8.5 عند تخفيض الري بنسبة 40% من الري الكلي عند الفترة 2040-2050 حيث بلغت القيمة 0.39 (كغم/م³).

كما يبين جدول (71) إن أطول فترة نمو سجلت عند فترة الاساس ثم بدء طول موسم النمو بالتناقص خلال فترة

الجدول 71. متوسط طول موسم النمو خلال فترة الأساس 1985-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 عند زيادة تركيز وثبات غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ وتخفيض الري 20% و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1985	
عند عجز مائي 20%			
-----	91.6	92.6	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 4.5
-----	91.0	92.5	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 8.5
عند عجز مائي 40%			
91.3	91.6	92.6	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 4.5
90.8	91.4	92.6	طول موسم النمو (يوم) من أجل السيناريو RCP 8.5

و0.4%، على التوالي مع عدم وجود فرق معنوي بالمقارنة مع فترة الأساس. أما خلال الفترة 2040-2050 فبلغ الانخفاض الإنتاجية كتغير مطلق ونسبي 0.49- و19.6%-، على التوالي. ونلاحظ بوجود فرق معنوي بالمقارنة مع فترة الأساس وعند مستوى معنوية قدرة 5%.

كما يبين جدول (73) بأن نسبة الانخفاض في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP8.5 عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد


السيناريو RCP4.5 وRCP8.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

يبين شكل (15) تقارب قيم الإنتاجية خلال الفترة 2020-2030 عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ في حالة السيناريو RCP4.5 على الرغم من خفض كميات مياه الري المضافة وبنسبة 20% من الري الكلي، لكن في حالة تخفيض الري وبنسبة 40% خلال الفترة 2040-2050 أدى إلى حدوث انخفاض واضح في الإنتاجية حيث بلغت (طن/ هكتار).

كما ونلاحظ أن إنتاجية محصول الطماطة في حالة السيناريو RCP8.5 قد انخفضت خلال الفترة 2020-2030 نتيجة تخفيض الري بمعدل 20% من الري الكلي. أما خلال الفترة 2040-2050 فنلاحظ أيضاً انخفاض الإنتاجية وبشكل واضح جداً نتيجة انخفاض الري بمقدار 40% من الري الكلي حيث بلغت (طن/ هكتار)، مما يبين تأثير التغيرات المناخية على الإنتاجية النباتية للمحصول خلال فترة المحاكاة.

كما مبينة في جدول (72) بأن نسبة الانخفاض في الإنتاجية من اجل السيناريو RCP4.5 عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة 2020-2030 كانت ذات تغير مطلق ونسبي قدرة 0.01

الشكل 15. التغيرات الحاصلة في إنتاجية الطماطة وفق تخفيض الري الى 20% و40% عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون



الري 20 و40% مع زيادة درجات الحرارة إلا أن انخفاض طول موسم النمو هو الذي أدى إلى انخفاض التبخر-نتح لمحصول الطماطة.

في حين يبين جدول (75) أن مقدار كل من التبخر-نتح الفعلي في حالة السيناريو RCP8.5 وعند زيادة تركيز CO₂ ينخفض مع الزمن خلال فترة المحاكاة، إذ بلغت أعلى قيمة للتبخر-نتح الفعلي 516.8 (مم)، وأقل قيمة خلال الفترة 2040-2050 مسجلة 395.5 (مم) لحالة تخفيض الري 40% بسبب انخفاض طول موسم النمو هو الذي أدى إلى انخفاض التبخر-نتح لمحصول الطماطة.

كما يبين شكل (16) زيادة بالإنتاجية المائية

الكربون خلال الفترة 2020-2030 كانت ذات تغير مطلق ونسبي قدرة 0.09- و3.6%، على التوالي مع عدم وجود فرق معنوي بالمقارنة مع فترة الأساس. أما خلال الفترة 2040-2050 فبلغ الانخفاض بالإنتاجية كتغير مطلق ونسبي 0.47- و18.7%، على التوالي. ونلاحظ بوجود فرق معنوي بالمقارنة مع فترة الأساس 1985-2005 وعند مستوى معنوية قدرة 5%.

ويبين جدول (74) أنه عند زيادة تركيز CO₂ في حالة السيناريو RCP4.5 فإن مقدار التبخر-نتح الفعلي ينخفض مع الزمن خلال فترة المحاكاة، إذ بلغت أعلى قيمة للتبخر-نتح الفعلي 517.3 (مم)، وبلغت أقل قيمة خلال الفترة 2040-2050 مسجلة 395.7 (مم) لحالة تخفيض

الجدول 72. متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% من أجل السيناريو RCP4.5 عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.5		الإنتاج في فترة الأساس (طن/هكتار)
40%	20%	نسبة التخفيض بالري
-0.49	+0.01	التغير المطلق (طن/هكتار)
-19.6	+0.4	التغير النسبي (%)
**7.7E-08	*0.8	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.

الجدول 73. متوسط إنتاجية الطماطة والتغير المتوقع في الإنتاجية عند تخفيض الري 20 و40% في حالة السيناريو RCP8.5 عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون

متوسط التغير خلال الفترة (2050-2040)	متوسط التغير خلال الفترة (2030-2020)	
2.51		الإنتاج في فترة الأساس (طن/هكتار)
40%	20%	نسبة التخفيض بالري
-0.47	-0.09	التغير المطلق (طن/هكتار)
-18.7	-3.6	التغير النسبي (%)
**1.5E-05	*0.37	أختبار الـ test-T

* غير معنوي. / ** معنوي.


الجدول 74. التبخر-نتح الفعلي خلال فترة الأساس 1985-2005 وخلال الفترات 2020-2030 و 2040-2050 في حالة السيناريو RCP4.5 لحالة زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO₂ وعند تخفيض الري 20 و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1985	
عند عجز مائي 20%			
-----	464.1	517.3	التبخر نتح الفعلي (مم)
عند عجز مائي 40%			
395.7	464.1	517.3	التبخر نتح الفعلي (مم)

الجدول 75. التبخر- التبخر- النتج الفعلي خلال فترة الأساس 2005-1985 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP8.5 عند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 وتخفيض الري 20% و40%

خلال الفترة 2050-2040	خلال الفترة 2030-2020	خلال فترة الأساس 2005-1985	
عند عجز مائي 20%			
-----	464.0	516.8	التبخر نتج الفعلي (مم)
عند عجز مائي 40%			
395.5	464.0	516.8	التبخر نتج الفعلي (مم)

الشكل 16. الإنتاجية المائية خلال فترة الأساس 2005-1985 وخلال الفترات 2020-2030 و2040-2050 في حالة السيناريو RCP8.5 وRCP4.5 وعند زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخفيض الري الى 20% و40%



لمحصول الطماطة عند زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون من اجل السيناريو RCP4.5 و RCP8.5، وسجلت أعلى قيمة عند الفترة 2020-2030 بالمقارنة مع فترة الاساس بلغت 0.54 و0.52 (كغم/م³)، رغم تخفيض الري بنسبة 20% من الري الكلي نتيجة زيادة الإنتاجية للمحصول بالاضافة الى زيادة الإنتاجية المائية عند تخفيض الري بنسبة 40% من الري الكلي وبلغت 0.53 و0.51 (كغم/م³) للسيناريو RCP8.5 وRCP4.5 عند زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون نتيجة لانخفاض التبخر- نتج الفعلي بنسبة أكبر من انخفاض الإنتاجية.

7. انعكاسات الدراسة على السياسات الزراعية والاقتصاد الوطني

- زيادة حدوث الايام الحارة سنوياً.
 - زيادة تواتر موجات الحر ومدتها وشدتها.
 - تغيرات تدريجية في الهطول المطري وتشمل:
 - زيادة تواتر موجات الجفاف وحالات الجفاف ومدتها وشدتها.
 - التغير في أماكن وكميات هطول الأمطار.
 - زيادة التقلبات الجوية وتشمل:
 - زيادة عدم الاستقرار في الانماط الجوية الموسمية.
 - التغير في بداية ونهاية الموسم.
- ومن انعكاسات تغير المناخ على الأمن الغذائي:
- تغييرات في صلاحية الأراضي للانواع المختلفة من المحاصيل والمراعي.
 - تغييرات في توزيع الموارد وفي إنتاجيتها وتجمعاتها.
 - تغييرات في ظهور وانتشار الانواع المختلفة من الافات والامراض.
 - تغييرات في توزيع المياه ذات النوعية الجيدة لاغراض زراعة المحاصيل.
 - خسارة اراضي صالحة للزراعة نتيجة زيادة الجفاف وما يصاحبه من زيادة بالملوحة.
- في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز استراتيجية التنمية الزراعية على الحفاظ على الارض الزراعية من التبوير والتجريف والاستخدامات الغير زراعية. وتهدف خطة التنمية إلى زيادة معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي الى (0.1%) بالإضافة الى تأمين الاحتياجات الغذائية وزيادة معدل الاكتفاء الذاتي، مع ضمان أعلى عائد من وحدة الاراضي والمياه مع الأخذ بنظر الاعتبار التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي والامن الغذائي لذا فإن استخدام هذا البرنامج سيفيد في:-
1. تطوير الزراعة المحلية.
 2. زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية مما يؤدي إلى تقليل الاستيرادات وخفض الدعم المقدم.
 3. معالجة المشاكل المناخية التي تؤدي إلى فقد الكثير من المحاصيل والتي تشكل خسارة اقتصادية كبيرة. كون التغيرات المناخية لها اثر واضح على قطاع الزراعة مستقبلاً حيث من المتوقع إن تؤثر سلباً على الإنتاج بانخفاض 20% مستقبلاً.
 4. ندرة موارد المياه بما يعمل على التأكيد على رفع كفاءة نظام الري وتقليل الفاقد وتخفيض المساحات بالنسبة للمحاصيل التي تستهلك مياه أكثر.
 5. تحديد مدى ارتفاع نسبة التصحر والجفاف والتخطيط مستقبلاً لتأثير التغيرات المناخية.

التدابير المقترحة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

1. دراسة ونشر اصناف وسلالات محاصيل متوائمة مع الظروف المناخية المتغيرة: إن استخدام أصناف مختلفة من النباتات والمكيفة للاوضاع المحلية، فضلاً عن أنتقاء وإكثار أصناف المحاصيل والسلالات المحلية المكيفة للظروف المتطرفة أو

أثار تغير المناخ ذات الاهمية بالنسبة للأمن الغذائي :

- زيادة توافر ثاني أوكسيد الكربون في الجو لنمو النبات.
- زيادة متوسطات درجات الحرارة وتشمل:
 - زيادة درجات الحرارة القصوى في الايام الحارة.
 - زيادة درجات الحرارة الدنيا في الايام الباردة.

عالية من المواد العضوية بالتربة وزيادة كفاءة استخدام المياه في الاراضي الزراعية إن تزيد القدرة على مقاومة الجفاف، وذلك من خلال الحفاظ على المياه وتقليل خطر أنجراف التربة. 4. مواءمة نظم الزراعة والاستراتيجيات المعيشية مع الظروف الزراعية الايكولوجية السريعة التغير: إن تغير المناخ سوف يغير النمط الجغرافي للمزايا النسبية لإنتاج السلع والخدمات الزراعية والبيئية. ولذلك ينبغي تعزيز نقل التكنولوجيا والابتكار بغية تسهيل التحولات في نظم الزراعة.

القادرة على مقاومتها من شأنه إن يمكن العديد من نظم الزراعة القائمة على التكيف بنجاح. كما ستزداد أهمية تربية وتحسين نباتات تتحمل الجفاف والاجهاد الحراري والملوحة. 2. تحسين البنية الاساسية لتجميع المياه وتخزينها واستخدامها على النطاق المحدود: إن إمكانية الوصول إلى موارد المياه ستشكل عاملاً حاسماً في استدامة العديد من النظم الزراعية. 3. تحسين ممارسات إدارة التربة: إن من شأن إجراءات تحسين تغلغل المياه وقدرة أنواع التربة على الاحتفاظ بالمياه والحفاظ على مستويات

8. الخطة المستقبلية المقترحة للفريق

- ازدياد التراكم الملحية من 320 جزء بالمليون الى 500 جزء بالمليون بالنسبة لنهر دجلة ومن 540 جزء بالمليون الى 930 جزء بالمليون بالنسبة لنهر الفرات.
- لقد افرزت نتائج الدراسة الإستراتيجية حقيقة أساسية مهمة وهي إن العراق سوف يواجه انخفاضاً مضطرباً في إيراداته المائية وذلك نتيجة لمشاريع التطوير التي تنفذها الدول المشاركة له في الحوضين وبحلول عام 2020 سوف يواجه العراق حقيقة إنه لن يكون لديه الكمية الكافية والنوعية الجيدة من المياه لتلبية احتياجاته التنموية وفي حالة تنفيذ الدول المشاركة في الحوضين لكامل خططها التطويرية فإن إيرادات العراق المائية في الانهر الرئيسية ستكون أقل من 24.5% عما عليه الان وستتردي نوعيتها ولمواجهة هذا الوضع الصعب يتعين على العراق إجراء اصلاحات واسعة في القطاعات المستخدمة للمياه.
- إن نتائج هذا البرنامج اذا ما طبق ستكون له اثار ايجابية على كيفية الادارة المتكاملة للعملية الزراعية ابتداءً من البذار حتى الحصاد وبالتالي يجب إن يكون هناك تنسيق دائم بين الجهة الداعمة للبرنامج واعضاء الفريق كما إن الفريق سيسعى من خلال الجهات القطاعية بالاتصال بالدوائر الزراعية ذات العلاقة لاقامة ورش لكوادرها ولل استفادة من هذا البرنامج وحسب الظروف المالية المتاحة لذا سيكون هذا البرنامج مكملاً للمشاريع والبرامج الزراعية التي لها دور في زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام المياه.
- انخفضت إيرادات العراق المائية عند الحدود ففي عام 2015 كانت كمية الواردات المائية 43.7 مليار م³ وإن كمية المياه السطحية الواردة المتوقعة الى العراق من دول المنبع حسب الدراسة الاستراتيجية لوزارة الموارد المائية لعام 2035 (28.5 مليار م³).
- لما للتغيرات المناخية تاثير كبير على تناقص الموارد المائية وإن موقع العراق بأعتباره دولة مصب يضعه في موقف حرج لأنه يتأثر سلبياً بأجراءات الدول الواقعة أعلى مجري نهر دجلة والفرات (تركيا وسوريا وايران)، إذ يعتمد العراق على المياه التي تتدفق إليه من دول أعالي حوضي دجلة والفرات وتتعرض إيرادات العراق المائية القادمة من خارجه إلى الأنخفاض نتيجة بناء السدود وأعمال التطوير الزراعي في دول أعالي الحوضين والنمو السكاني والتنمية الصناعية فيها وفي ظل عدم وجود اتفاقيات دائمة لتحديد الحصص المائية لكل دولة مشاركة في الحوضين وتحديد مستويات مقبولة لنوعية المياه الواصلة لحدود العراق فإن تلك الصعوبات تتفاقم عندما تترافق مع ظاهرة التغيرات المناخية، ولتعظيم استخدامات المياه وتطوير البنى التحتية لمجابهة التحديات المائية وتحديد الاجراءات اللازمة للتكيف معها والتي تلبى متطلبات التنمية المستدامة.
- وبهذا فإن مشاريع التطوير للدول الثلاثة من المتوقع إن تشكل تحديين رئيسيين:

9. التوصيات

- إن العوامل الطبيعية التي ذكرت آنفاً تؤثر بشكل اساسي في تحديد مستويات الإنتاج والغلة للمحاصيل الرئيسية في العراق حيث يتميز كل من مؤشري الإنتاج والغلة في المحاصيل الحقلية بالتذبذب الكبير. كما إن الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل الحقلية والمحاصيل الأخرى تتباين حسب السنوات وحسب المحافظات وفقاً لظروف المناخ والتربة ومصادر ونوعية المياه إضافة الى إمكانيات الكادر البشري المتوفر، مما يستدعي استخدام الطرق والوسائل التالية :
- استخدام الوسائل الحديثة للإدارة المتكاملة للموارد المائية وبناء نموذج رياضي يحاكي منظومة الموارد المائية في العراق وعلاقتها مع المتغيرات المختلفة في Iraq Water Systems Planning Model.
- وضع إجراءات الانذار المبكر للتحذير من كوارث الجفاف والفيضان.
- تحسين ادارة الزراعة الديمية (المطرية) عن طريق حفر الابار المائية وتطبيق الري التكميلي باستخدام تقانات الري الحديثة.
- رفع كفاءة الري في الزراعة المروية عن طريق تطوير الري الحقلية باستخدام اساليب الري الحديث وكذلك تبطين القنوات والري المغلق لتقليل الضائعات.
- انشاء نظام رصد فعال لمراقبة الطقس - محصول خلال الموسم الزراعي.
- استخدام اساليب المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيماوية واستخدام المكافحة الصديقة للبيئة كما هو مستخدم في المكافحة (النيم).
- ادخال واستنباط اصناف نباتية مقاومة للجفاف ومعايشة للملوحة.
- تحديد تدابير التكيف الممكنة (السياسات، الاستراتيجيات وخطط العمل المستدامة الخاصة بموارد المياه) لمجابهة تغيرات المناخ المحتملة.
- السيطرة ومراقبة استخدام المياه الجوفية وعدم استخدام المياه الغير متجددة.
- تطوير المصادر غير التقليدية للمياه التي يمكن استغلالها في المستقبل ومنها استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة وكذلك استخدام مياه البزل بعد تحليتها.
- استخدام اساليب الزراعة الحديثة المتكاملة من استخدام البادرة المسمدة والتسميد العضوي الذي يزيد من إنتاجية وحدة المساحة والري الحديث الذي يزيد إنتاجية وحدة المياه
- ايجاد أنماط مختلفة للزراعة كالزراعة المغطاة والزراعة المائية (الزراعة بدون تربة) لغرض ترشيد إستهلاك المياه من جهة والتخلص من الملوحة السائدة في الترب.
- الاستمرار بالبرامج والمشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة التي تؤدي الى زيادة إنتاجية الدونم وزيادة كفاءة استخدام المياه كبرنامج تنمية الحنطة وبرنامج استنباط بذور الرتب العليا للحنطة والبرامج الأخرى في دائرة البحوث لتطوير محاصيل الحبوب ومشروع تنمية بذور محاصيل الخضر في دائرة البستنة ومشروع تقانات الري الحديثة ومراكز الارصاد الجوية الزراعية لتوفير البيانات المناخية للمناطق الزراعية.
- إعداد تقرير وطني لكل محصول وعلى مستوى التقسيم البيئي للعراق، واعتماد مؤشرات هذا التقرير في تطوير زراعة المحاصيل. والعمل بالمشاركة مع دوائر الارشاد الزراعي في متابعة تنفيذ مقررات وتوصيات التقرير الوطني.
- استمرار عمل اللجنة المركزية ممن تدربوا على البرنامج في متابعة أعمال الفرق بالمحافظات، وتحديث التقرير كل خمس سنوات وفقاً للظروف المناخية ومواكبة مع خطة التنمية الوطنية.
- اعتماد مخرجات وتوصيات التقرير الوطني للمحاصيل وحسب كل محافظة كصيغة عمل في مديريات الزراعة.

